

ການລ້ຽງໝູ

I. ການປຸກສ້າງຄອກ

1. ການເລືອກສະຖານທີ່:

ສະຖານທີ່ ທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບ ການ ປຸກສ້າງຄອກໝູ ຄວນ ເປັນບ່ອນໂນນສູງ ນ້ຳບໍ່ຖ້ວມ ,ຄວນປຸກຄອກ ໝູ ຫ່າງຈາກເຮືອນ ຢ່າງນ້ອຍ 15 — 20 ແມັດເພື່ອປ້ອງກັນກິ່ນເໝັນ.


2. ແບບຄອກໝູ:

ຄອກໝູທີ່ນິຍົມສ້າງມີ 4 ແບບຄື:

ກ. ແບບເທິບໝາແຫງນທຳມະດາ




ຂ. ແບບເທິບໝາແຫງນກ່າຍ



ຄ. ແບບຫ້າຈົ່ວທຳມະດາ



ງ. ແບບຫ້າຈົ່ວ 2 ຊັ້ນ



ເນື້ອທີ່ບັນຈຸໝູແຕ່ລະລັ້ນ

ໝູລ້ຽງລູກ	ໝູພໍ່ແມ່ພັນ	ໝູລຸ້ນ	ໝູນ້ອຍ
4 ຕາແມັດ ຕໍ່ໂຕ	2 ຕາແມັດ ຕໍ່ໂຕ	1 ຕາແມັດ ຕໍ່ໂຕ	0,5 ຕາແມັດ ຕໍ່ໂຕ

II. ການຄັດເລືອກແນວພັນ :

ປັດໃຈສໍາຄັນໃນການເລືອກແນວພັນມີດັ່ງນີ້:

- ◆ ບໍ່ເອົາໝູທີ່ມາຈາກສາຍເລືອດໃກ້ຄຽງກັນ.
- ◆ ເລືອກໂຕທີ່ໄດ້ມາຈາກແມ່ທີ່ລ້ຽງລູກດີໃຫຍ່ໄວໃຫ້ລູກຫຼາຍ ແລະໂຕທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວກ່ວາໝູໃນ ຝູງ.
- ◆ ເອົາໂຕທີ່ມີເຕົ້ານົມ 12 ເຕົ້າ, ມີໂລຍະຫ່າງສະໜ້າສະເໝີ.
- ◆ ເລືອກເອົາໂຕທີ່ມີຮູບຮ່າງສົມບູນດີ ຖ້າເປັນໂຕຜູ້ ຄວນ ເລືອກເອົາໂຕທີ່ໃຫຍ່, ແຄ່ງຂາແຂງແຮງ ແກ່ນອັນທະໃຫຍ່ ສະ ໜ້າສະເໝີ.

ລັກສະນະປະຈຳພັນ:

ໝູພັນ ທີ່ນິຍົມກັນລ້ຽງໃນບ້ານ ເຮົາມີ 3 ສາຍພັນຄື:

1. ພັນລາກສະວາຍ (LW):

ໝູພັນລາກສະວາຍ



ເປັນໝູພັນທີ່ມີຂາວລ້ວນ ຫົວໃຫຍ່ ແຄ່ງຂາໃຫຍ່ແລະ ແຂງແຮງ ໃບຫູຕັ້ງຊື່ ລ້ຽງລູກດີ ໃຫ້ລູກຫຼາຍສະເລັ່ງ 12 — 14 ໂຕ ຕໍ່ ຊອກ.

2. ພັນແລນເດຣດ(LD):

ເປັນໝູພັນທີ່ມີຂົນ ແລະ ໜັງສີ ຂາວລ້ວນ ລຳຕົວຍາວ ໃບຫູຕູບ ໃຫ້ລູກຫຼາຍສະເລັ່ຍ 12—14ໂຕ ຕໍ່ ຊອກ.

ໝູ ພັນແລນເດຣດ



3. ພັນດູຮອກ (DR):

ເປັນພັນມີສີແດງເຂັ້ມ ມີຮູບຮ່າງ ໃຫຍ່ແຂງແຮງຫົວໃຫຍ່ປາຍ ຫູພັບນ້ອຍໜຶ່ງ ໃຫ້ລູກບໍ່ດົກ ແຕ່ໃຫ້ຊີ້ນຫຼາຍໃຫຍ່ໄວທົນທານຕໍ່ສະ ພາບດິນຟ້າອາກາດ ເໝາະກັບການເຮັດລູກປະສົມ 3 ສາຍເລືອດ.

ໝູ ພັນດູຮອກ



III. ການປະສົມພັນ:

ກວດກາໝູແມ່ຂຶ້ນເພດ ກວດດ້ວຍຕາຄືເບິ່ງອະໄວຍະວະເພດ ໝູນັ້ນຈະໃຄ່ມີສີແດງ, ໃຊ້ພັນກວດກາປະກົດການຂອງໝູແມ່ພັນ ໃຊ້ມີຂົນຫຼັງ ແມ່ພັນ.

ປະກົດການຂຶ້ນເພດຂອງໝູແມ່ພັນ: ອະໄວຍະວະເພດບວນ ແດງ ກະວົນກະວາຍບໍ່ກິນອາ ຫາຂັ້ນໂຄມໂຕອື່ນແລະ ມີນ້ຳເນືອກ ໄຫຼອອກມາ.

ໂລຍະໝູຂັ້ນເພດ: ມີ 3 ໂລຍະຄື:

◆ **ໂລຍະຕົ້ນ:** ໝູແມ່ພຽງສະແດງອາການ ກະວີນກະວາຍ ບໍ່ກິນ ອາຫານແລະອະໄວຍະວະເພດບວມແດງ.

◆ **ໂລຍະກາງ:** ໂລຍະນີ້ ອະໄວຍະວະເພດແຫ້ວລົງເລັກນ້ອຍ ເປັນສີຊຸ້ມພູ ແລະ ໝູແມ່ຈະຢືນຊຶ່ງແມ່ນເໝາະໃນການປະສົມພັນ ແລະ ໃຫ້ປະສົມພັນທັນທີ, ໃຊ້ເວລາ 48 ຊົ່ວໂມງ, ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄວນປະສົມພັນ 2 ຄັ້ງຫ່າງກັນປະມານ 12 ຊົ່ວໂມງເຊົ້າແລະແລງ.

◆ **ໂລຍະທ້າຍ:**

ອະໄວຍະວະໝູແມ່ ແຫ້ວລົງ ແຕ່ຍັງຂຶ້ນໂຄມ ໂຕອື່ນ ແຕ່ໂຕ ອື່ນຂຶ້ນໂຄມບໍ່ໄດ້ ຖ້າເຮົາເອົາມືກະ ຕຸ້ນຈຸດ ຕ່າງໆ ໝູແມ່ຈະແລ່ນ ຫຼືໂລຍະນີ້ປະສົມພັນອາດບໍ່ໄດ້ດີ.

VI. ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ

ຄວນໃຫ້ອາຫານພື້ນບ້ານເຊັ່ນ: (ຮຳ, ເຂົ້າປຽນ, ສາລີ, ມັນຕົ້ນ, ຂີ້ເຫຼົ້າ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ຟິດຜັກຕ່າງໆ), ອາຫານສຳເລັດ ຮູບຈາກໂຮງງານ (ແຕ່ລາຄາແພງ).

ການໃຫ້ອາຫານໝູແມ່ລະລຸ້ນແຕກຕ່າງກັນຄື: ໝູນ້ອຍຢາ ນົມ ໃຫ້ມື້ໜຶ່ງ 200 ກຣາມ ແບ່ງເປັນ 4 ຄາບ/ມື້ ສ່ວນໝູລຸ້ນໃຫ້ 2—2,5 ກິໂລ/ໂຕ/ມື້, ພໍແມ່ພັນໃຫ້ 3—3,5 ກິໂລ/ມື້ໂດຍ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຄາບ.

V. ບາງພະຍາດທີ່ມັກເກີດກັບໝູ

1. **ພະຍາດອະຫິວາໝູ:**

ພະຍາດນີ້ເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ສຳລັບໝູແລະ ລະບາດ ໄດ້ຢ່າງໄວວາ, ຖ້າໝູຕິດເຊື້ອ ພະ ຍາດນີ້ແລ້ວ ຈະ ຕາຍເຖິງ 80—100%. ສາຍເຫດ: ເກີດຈາກ ເຊື້ອໄວຣັດ, ຄອກເປື້ອນ , ໝູທີ່ຕິດພະ ຍາດນີ້ ຈະບໍ່ ກິນອາຫານ ເຫງົາ, ໄຂ້ຂຶ້ນສູງ ນອນຈຸ່ມກັນ, ຫາຍໃຈ ຟິດ, ຫາ ອິດໝູຈະຂີ້ແກ່ນ ແລະ ຕໍ່ມາຂີ້ຈວກ ຢູ່ຕາມໃບໝູ, ແອບແອ ຂາ , ພື້ນທີ່ອາໄສມີຜຸນຊ້ຳ ແລະ ສອງຂາຫຼັງລ່ອຍ .

◆ **ການປ້ອງກັນ:**

ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍ ການ ສັກຢາວັກຊີນ ອະຫິ ວາໝູ 2

ເທື່ອຕໍ່ປີ ແລະ ສາມາດສັກໝູທີ່ມີອາຍຸ 1 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ

ຖ້າໂຕໃດທີ່

ສົງໄສເປັນພະຍາດນີ້ຄວນແຍກ ອອກ ຈາກຝູງໂດຍດ່ວນ. ແລະ ທຳການ ຂ້າເຊື້ອຄອກດ້ວຍປູນຂາວ ຫລື ຢາ ຂ້າ ເຊື້ອອື່ນ.

◆ **ການປິ່ນປົວ:**

ພະຍາດນີ້ ບໍ່ສາມາດຈະປິ່ນປົວໄດ້ ມີແຕ່ສັກ ຢາປ້ອງ ກັນ ເທົ່ານັ້ນ.

2. **ພະຍາດຂີ້ແຈັບທ້ອງຂອງໝູນ້ອຍ:**

ຖ້າໝູນ້ອຍເປັນພະຍາດນີ້ແລ້ວໂຕທີ່ລອດຕາຍລ້ຽງນານ ໃຫຍ່ແລະມັກຈະ ເກີດກັບໝູນ້ອຍດູດນົມ ແລະ ໝູນ້ອຍຢາມົມ.

◆ **ສາຍເຫດ:**

ເກີດຈາກເຊື້ອອີໂກລາຍ, ຈາກຄອກໝູທີ່ ເປື້ອນ, ດູດເຕົ້ານົມ ແມ່ທີ່ບໍ່ສະອາດ, ຄອກບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊື້ອ ແລະ ອາກາດມີການປ່ຽນ ແປງຢ່າງກະທັນຫັນ.

◆ **ອາການ:**

ໝູນ້ອຍຈະເຈັບທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງ, ຂີ້ເປັນນ້ຳສີ ຂາວປົນ ຂຽວ ມີກິ່ນເໝັນຄາວ, ໝູນ້ອຍອອ່ນເພີຍ ອຸ່ນຫະ ພຸມຫລຸດຕົນໂຕ ເຢັນ 2 ຂາຫຼັງລ່ອຍແລະຕາຍໃນ ທີ່ສຸດ.

◆ **ການປ້ອງກັນ:**

ໃຫ້ໝູນ້ອຍ ທີ່ເກີດໃໝ່ ກິນນ້ຳນົມ ເຫຼືອງ ຈາກແມ່ໃຫ້ຫຼາຍ, ຮັກສາຄອກບໍ່ໃຫ້ປຽກຊຸ່ມໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ ຢ່າງພຽງພໍ.

◆ **ການປິ່ນປົວ:**

ສັກຢາຕ້ານເຊື້ອ ເຈນຕາໂມຊິນທີ, ສະ ເຕັບ ໂຕໂມຊິນ, ເປນີ ຊີລິນ, ເອໂລຟຣອກ ຕິດຕໍ່ກັນ 3 ວັນ ນອກຈາກນີ້ຄວນໃຫ້ວິ ຕາມິນຕື່ມເພື່ອຊ່ວຍ ໃຫ້ໝູ ນ້ອຍ ແຂງແຮງ.



Supported by
Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.

ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ສູນສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ ແລະ ປາ



ເຕັກນິກ ການລ້ຽງໝູ



ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ປາ

ໂທລະສັບ: (021) 621018

ແຟກ: (021) 621018

Email : lec@laotel.com

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ : ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)