



ຄູ່ມືການລ້ຽງແບ້



ຂຽນໂດຍ: ອາ. ປອ. ນ. ດາວວີ ກອງມະນີລາ

ມີນາ 2022

ຄູ່ມືການລ້ຽງແບ້

ຊື່ໂມດູນ	ການລ້ຽງແບ້
ຊື່ອົງປະກອບການຮຽນ	- ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການລ້ຽງແບ້ - ເຕັກນິກການເລືອກສະຖານທີ່ ແລະ ການສ້າງຄອກແບ້ - ເຕັກນິກການຄັດເລືອກແບ້ມາລ້ຽງ - ວິທີການລ້ຽງ ແລະ ການຈັດການ - ເຕັກນິກການໃຫ້ອາຫານແບ້ - ການຮັກສາສຸຂະພາບແບ້
ອົງກອນອະນຸມັດ	ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ຂຽນໂດຍ: ອຈ. ປອ. ນ. ດາວວີ ກອງມະນີລາ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ຄະນະກະເສດສາດ (ວິທະຍາເຂດນາບົງ)

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ເບີໂທ: (856) 21 870048, 020 52365553, 59459635

ອີເມລ: d.kongmanila@nuol.edu.la

ເວັບໄຊທ໌: <http://fag.nuol.edu.la>



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ

528 - - -
ເລກທີ /ອສ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 13 ມີນາ 2022

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການ ຮັບຮອງຄູ່ມື ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ

- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 633/ນຍ, ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2021;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງຫ້ອງການ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິບັດລາວ ສະບັບເລກທີ 093/ຫກ ລົງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2022.

ຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ ຕົກລົງ:

- ມາດຕາ 01 ອະນຸມັດໃຫ້ຫ້ອງການ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິບັດລາວ ນຳໃຊ້ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ ໃນ 15 ສາຂາອາຊີບ ແລະ 03 ໂມດູນໝວດຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ຄື: 1)ອາຊີບລ້ຽງໝູ 2)ອາຊີບລ້ຽງກົບ 3)ອາຊີບລ້ຽງໄກ່ 4)ອາຊີບລ້ຽງງົວທອມ 5)ອາຊີບລ້ຽງປານິນ 6)ອາຊີບລ້ຽງປາດຸກ 7)ອາຊີບລ້ຽງເປັດ 8)ອາຊີບລ້ຽງແບ້ 9)ອາຊີບປຸກຜັກກະລໍາບີ 10)ອາຊີບປຸກຜັກກາດຊອມ 11)ອາຊີບປຸກເຫັດນາງຟ້າ 12)ອາຊີບປຸກເຫັດເພືອງ 13)ອາຊີບປຸກເຫັດຂອນຂາວ 14)ອາຊີບການຕໍ່າຫຼກຍອມສີທໍາມະຊາດ(ລະດັບຕົ້ນ) 15)ອາຊີບການຕໍ່າຫຼກຍອມສີທໍາມະຊາດ(ລະດັບກາງ) 16)ການວາງແຜນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 17)ການສື່ສານສໍາລັບຜູ້ປະກອບການ ແລະ 18)ທັກສະການສື່ສານສໍາລັບຄູ່ຝຶກ;
- ມາດຕາ 02 ໃຫ້ຫ້ອງການ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິບັດລາວ ສົມທົບກັບພວກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດຳເນີນຝຶກອົບຮົມຕາມຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ແລະ ປະເມີນຜົນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຕາມລະບຽບຫຼັກການ;
- ມາດຕາ 03 ໃຫ້ຫ້ອງການຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິບັດລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ່າງໆ ຈົ່ງພ້ອມກັນປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວ;
- ມາດຕາ 04 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ບ່ອນສົ່ງ:

- ພະແນກຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ
- ຫ້ອງການຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິບັດລາວ
- ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແຫ່ງລະ
- ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ບ່ອນລະ
- ເກັບມ້ຽນ

- 01 ສະບັບ
- 01 ສະບັບ
- 01 ສະບັບ
- 01 ສະບັບ
- 02 ສະບັບ



ຫົວໜ້າກົມ

ໝູ່ພັນ ອຸດສາ
Nouphanh OUTSA

ສາລະບານ

ໜ້າ

ບົດນຳ.....	5
I. ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການລ້ຽງແບ້.....	6
❖ ລັກສະນະພິເສດ ແລະ ນິດໄສຂອງແບ້.....	7
❖ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນິດໄສຂອງແບ້	8
❖ ບັນຫາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການລ້ຽງແບ້	8
II. ເຕັກນິກການເລືອກສະຖານທີ່ ແລະ ການສ້າງຄອກແບ້	10
III. ເຕັກນິກການຄັດເລືອກແບ້ມາລ້ຽງ.....	12
❖ ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ແບ້ມີອາຍຸເທົ່າໃດ?	13
IV. ວິທີການລ້ຽງ ແລະ ການຈັດການ.....	15
4.1. ວິທີການຈັດການຝຸງແບ້.....	16
❖ ເຮົາຈະສັງເກດແນວໃດວ່າແບ້ຖືພາ ຫຼື ບໍ່.....	18
4.2. ວິທີການດູແລຮັກສາແບ້ນ້ອຍຫຼັງຢ່າງນົມ	19
4.3. ການດູແລຮັກສາ ແລະ ການຈັດການແບ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ	20
V. ເຕັກນິກການໃຫ້ອາຫານແບ້	24
❖ ອາຫານເສີມສຳລັບແບ້.....	25
VI. ການຮັກສາສຸຂະພາບແບ້.....	29
❖ ການສັງເກດ ແລະ ຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງແບ້.....	30
❖ ພະຍາດທີ່ມັກເກີດກັບແບ້.....	32
❖ ສິ່ງອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກກາຝາກພາຍໃນ.....	36
❖ ກາຝາກພາຍນອກ	36

ບົດນຳ

ແບ້ເປັນສັດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ມີຄຸນປະໂຫຍດໃຫ້ຜົນຜະລິດທັງຊີ້ນ, ນົມ ແລະ ຂົນ ເຊິ່ງສາມາດເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້. ໃນປະຈຸບັນ, ຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກຊີ້ນແບ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກແມ່ນຍັງມີສູງ. ແບ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບຊາວກະສິກອນທີ່ທຸກຍາກ ຫຼື ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດລົງທຶນຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງການພື້ນທີ່ໜ້ອຍ, ນອກນັ້ນ ຍັງພົບວ່າແບ້ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍພັນສູງ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການລ້ຽງແບ້ຂອງໃນໄລຍະທີ່ມາຜ່ານ ໃນ ສປປ ລາວ, ກໍ່ຍັງພົບຫຼາຍບັນຫາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ພະຍາດລະບາດ, ການຂາດແຄນອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ, ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມເທົ່າທີ່ຄວນ, ແລະ ອື່ນໆ. ບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການລ້ຽງແບ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຕ່ຳ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາວິທີການປັບປຸງການຜະລິດແບ້ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນຕື່ມ.

ປຶ້ມຄູ່ມື “ເຕັກນິກການລ້ຽງແບ້” ສະບັບນີ້ ໄດ້ຂຽນ ແລະ ຮວບຮວມເພື່ອນຳສະເໜີຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ເຕັກນິກການປະຕິບັດຕົວຈິງຂັ້ນພື້ນຖານ, ສາມາດໃຊ້ເປັນອຸປະກອນໃນການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການລ້ຽງແບ້ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງແບ້, ນັກຮຽນນັກສຶກສາວິຊາຊີບ ຫຼື ຜູ້ທີ່ສົນໃຈທົ່ວໄປ.

ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມຈາກຄວາມຮູ້, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ, ແລະ ປະສົບການຕົວຈິງ ພ້ອມທັງບັນດາຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ບັນດາຮູບພາບຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອແນະນຳເຕັກນິກພື້ນຖານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການລ້ຽງແບ້ຂອງຊາວກະສິກອນ ໃນ ສປປ ລາວ.

ທັນວາ, 2021

ອຈ. ປອ. ນ. ດາວວີ ກອງມະນີລາ

ອົງປະກອບການຮຽນ	ຈຳນວນໜ້າ: 05
ຊື່ອົງປະກອບການຮຽນທີ 1 : ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການລ້ຽງແບ້	
ຊື່ໂມດູນ: ເຕັກນິກການລ້ຽງແບ້	ລະຫັດ
ຊື່ອາຊີບ: ລ້ຽງສັດ	

ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການລ້ຽງແບ້, ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລັກສະນະພິເສດຂອງການລ້ຽງແບ້ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງການລ້ຽງແບ້

ພາກສະເໜີ

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການລ້ຽງແບ້ ຈະລວມມີເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ດີ, ບັນຫາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງການລ້ຽງແບ້, ພ້ອມກັນນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງລັກສະນະພິເສດ ແລະ ນິດໄສຂອງແບ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.



I. ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການລ້ຽງແບ້


***ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງລ້ຽງແບ້?



ຍ້ອນວ່າ ແບ້ມີຂໍ້ດີຫຼາຍໆຢ່າງ ເຊັ່ນ:

- ແບ້ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ມີຄຸນປະໂຫຍດໃຫ້ຜົນຜະລິດທັງຊີ້ນ, ນົມ ແລະ ຂົນ ເຊິ່ງສາມາດເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້

- ແບ້ຫາກິນເກັ່ງ, ກິນອາຫານໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ນຳໃຊ້ຜືນທີ່ໃນການລ້ຽງໜ້ອຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ງົວ ຫຼື ຄວາຍ
- ແບ້ລ້ຽງໃຫຍ່ໄວ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວ
- ແບ້ມີຄວາມສົມບູນຜັນສູງ ແບ້ແມ່ສາມາດເກີດລູກແຝດ 2-3 ໂຕ, ໃຊ້ເວລາລ້ຽງລູກສັ້ນ ແລະ ສາມາດຖືພາຄັ້ງ ໃໝ່ໄດ້ໄວອີກ
- ໃຊ້ແຮງງານໜ້ອຍໃນການດູແລແບ້ (ຜູ້ຍິງ ຫຼື ເດັກນ້ອຍ ກໍ່ສາມາດເບິ່ງແຍງດູແລແບ້ໄດ້)
- ແບ້ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ, ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ຮ້ອນໄດ້ດີ
- ແບ້ສາມາດເປັນອາຫານສຳລັບຄົນເຮົາໃນທຸກໆສາສະໜາ “ບໍ່ມີສາສະໜາໃດຫ້າມບໍລິໂພກຊີ້ນແບ້”
- ແບ້ເປັນສັດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ກິນອາຫານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ລວມທັງຈຳພວກຫຍ້າ, ໃບຜິດ & ອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍເຂົ້າໃຈວ່າ: “ແບ້ລ້ຽງງ່າຍ ແລະ ສາມາດກິນໄດ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ”



II. ລັກສະນະພິເສດ ແລະ ນິດໄສຂອງແບ້



ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າແບ້ເປັນສັດທີ່ລ້ຽງງ່າຍ ແລະ ກິນໄດ້ທຸກໆຢ່າງ, ນັ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າ ແບ້ເປັນສັດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ ແລະ ມີນິດໄສເລືອກກິນຫຼາຍ, ປາກຂອງແບ້ມີຂະໜາດນ້ອຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດເລືອກ ແລະ ກິນພາກສ່ວນນ້ອຍໆຂອງໃບຜິດ ແລະ ອາຫານປະເພດຕ່າງໆໄດ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ ແບ້ຍັງມີລະບົບການຍ່ອຍທີ່ພິເສດທີ່ສາມາດຍ່ອຍໄດ້ທັງອາຫານຫຍາບ (ປະເພດຫຍ້າ ແລະ ໃບຜິດຕ່າງໆ) ແລະ ອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນໄດ້ (ອຳ, ສາລີ, ມັນຕົ້ນແຫ້ງ ແລະ ອື່ນໆ...ແມ້ແຕ່ ອາຫານບາງຊະນິດທີ່ຄົນເຮົາກິນ).

ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ນິໄສເລືອກກິນຂອງແບ້ກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກມັນພົບກັບບັນຫາຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ຕາມມາເຊັ່ນ: ການກິນອາຫານເປີເປື້ອນແລ້ວມີເຊື້ອພະຍາດປະພຶມມາ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ແບ້ເປັນພະຍາດແລ້ວ...ທ້າຍທີ່ສຸດ “ແບ້ກໍ່ຕາຍໄດ້”. ພ້ອມກັນນັ້ນ ນິໄສຂອງແບ້ຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ລ້ຽງເຂົ້າໃຈຜິດແລ້ວເອົາພຽງແຕ່ອາຫານຊະນິດດຽວມາໃຫ້ມັນກິນຕະຫຼອດເວລາ, ຖ້າແບ້ໄດ້ກິນແຕ່ອາຫານແບບເດີມໆ ຫຼື ຊະນິດດຽວ ຫຼາຍໆວັນຕິດຕໍ່ກັນກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ແບ້ມີບັນຫາເລື່ອງສຸຂະພາບໄດ້.

III. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນິດໄສຂອງແບ້

ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາຄວນເຂົ້າໃຈນິດໄສ ແລະ ຜິດຕິກຳການກິນຂອງແບ້ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ແບ້ມັກກິນອາຫານທີ່ຢູ່ສູງ (ສູງພຽງຫົວຂອງມັນ)
- ແບ້ມັກຢູ່ລວມຝູງ ແລະ ກິນອາຫານແບບເປັນຝູງ
- ແບ້ມັກກິນອາຫານ ແລະ ນ້ຳ ທີ່ສະອາດ
- ແບ້ມັກກິນອາຫານຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ເຊິ່ງແບ້ຈະເລືອກອາຫານທີ່ດີ ແລະ ຈະກິນຫຼາຍຖ້າມັນມັກຫຼາຍ! ແຕ່ຖ້າບໍ່ມັກ, ມັນກໍ່ຈະຊົມເບິ່ງເທົ່ານັ້ນ
- ແບ້ມັກກິນອາຫານປະເພດຕົ້ນຝູ່ມ ຫຼື ໃບໄມ້ປະເພດຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າປະເພດຫຍ້າ, ເຝືອງ ແລະ ອື່ນໆ
- ❖ ແບ້ຈະຮູ້ສຶກເປື້ອນອາຫານໄດ້ງ່າຍ ເມື່ອໄດ້ຮັບອາຫານແບບເກົ່າຊ້ຳກັນຫຼາຍໆຄາບ ຫຼື ຫຼາຍໆມື້ຕິດຕໍ່ກັນ
 - × ແບ້ບໍ່ມັກກິນທີ່ປູກຊຸ່ມ, ເປື້ອນ ຫຼື ມີກິ່ນເໝັນ



IV. ບັນຫາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການລ້ຽງແບ້

- ⊕ ບັນຫາຕົ້ນຕໍຂອງການລ້ຽງແບ້ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນການໃຫ້ຜົນຜະລິດຕ່ຳ ແລະ ມັກເກີດພະຍາດລະບາດ ແລະ ແບ້ຕາຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ
 - ແບ້ໄດ້ຮັບອາຫານບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ (ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ)
 - ⊕ ພື້ນທີ່ໃນການລ້ຽງແບ້ຖືກຈຳກັດລົງ ແລະ ແຮງງານພາຍໃນຄອບຄົວທີ່ຈະດູແລເອົາໃຈໃສ່ແບ້ກໍ່ມີຈຳກັດ
 - ⊕ ລະບົບການລ້ຽງແບ້ດັ້ງເດີມທີ່ລ້ຽງແບບປ່ອຍໃຫ້ແບ້ຊອກຫາກິນອາຫານເອງ, ໃນບາງຂົງເຂດແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມ ແລ້ວ, ຍ້ອນວ່າ ເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ໃນການປູກຝັງເສດຖະກິດ ຫຼື ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ...



- ⊕ ຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ທັກສະໃນການລ້ຽງແບ້, ການດູແລຮັກສາ ແລະ ການຈັດການທີ່ດີຂອງຊາວກະສິກອນກໍ່ຍັງຈຳກັດໃນບາງຂົງເຂດ. ພະຍາດທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບແບ້ ເຊັ່ນ: ກາຝາກພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ, ພະຍາດເຈັບປາກ, ປາກເປື້ອນລົງເລັບ, ຖອກທ້ອງ, ທ້ອງເບັ້ງ, ປອດອັກເສບ ແລະ ອື່ນໆ.... ຖ້າແບ້ມີແມ່ກາຝາກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ມີພະຍາດອື່ນໆແຊກຊ້ອນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ແບ້ຕາຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ *ແບ້ນ້ອຍທີ່ຫາກໍ່ຢ່າມີມ.*



ຮູບພາບ: ແບ້ນ້ອຍຢ່າມມີອາການທ້ອງເບັ້ງ, ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນເໜັງດ້ວຍຕົວເອງໄດ້

ອົງປະກອບການຮຽນ	ຈຳນວນໜ້າ: 02
ຊື່ອົງປະກອບການຮຽນທີ 2 : ເຕັກນິກການເລືອກສະຖານທີ່ ແລະ ການສ້າງຄອກແບ້	
ຊື່ໂມດູນ: ເຕັກນິກການລ້ຽງແບ້	ລະຫັດ
ຊື່ອາຊີບ: ລ້ຽງສັດ	

ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ອະທິບາຍໄດ້ ເຕັກນິກໃນການຄັດເລືອກສະຖານທີ່ ແລະ ວິທີການສ້າງຄອກແບ້ຂັ້ນພື້ນຖານ ຖືກຕ້ອງຕາມຄຸນນະພາບລ້ຽງແບ້.

ພາກສະໜີ

ເຕັກນິກການເລືອກສະຖານທີ່ ແລະ ການສ້າງຄອກແບ້ ຈະລວມເອົາເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄັດເລືອກສະຖານທີ່, ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ລັກສະນະຂອງຄອກແບ້ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳໃນການສ້າງຄອກແບ້ຂັ້ນພື້ນຖານ

I. ເຕັກນິກການເລືອກສະຖານທີ່

- ✓ ສະຖານທີ່ລ້ຽງແບ້ ຄວນເປັນບ່ອນສູງ, ໂນນ, ບໍ່ມີນ້ຳເປື້ອນ/ນ້ຳຖ້ວມຂັງ, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ (ມີອາກາດຖ່າຍເທດີ ແລະ ບໍ່ເປີເປື້ອນ) ພື້ນທີ່ທີ່ເໝາະສົມໃນການລ້ຽງແບ້ຄວນເປັນເຂດທີ່ມີອາຫານທຳມະຊາດຫຼາກຫຼາຍ ຊະນິດ (ມີຕົ້ນໄມ້ຜຸ່ມ, ຫຍ້າ ແລະ ພືດອື່ນໆ) ຫຼື ເປັນພື້ນທີ່ສາມາດປູກພືດອາຫານສັດໄດ້!
- ✓ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລ້ຽງມີປະສິດທິຜົນທີ່ດີ, ການກຳນົດຈຳນວນສັດແບ້ໃນພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງຈະຕ້ອງອີງຕາມປະລິມານຂອງອາຫານສຳລັບແບ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຊະນິດອາຫານທີ່ນຳໃຊ້, ຊະນິດພືດທີ່ມີໃນທຳມະຊາດ ຫຼື ຊະນິດພືດທີ່ປູກສຳລັບລ້ຽງແບ້, ຜົນຜະລິດພືດທີ່ສາມາດເປັນອາຫານແບ້, ຮູບແບບການລ້ຽງແບ້ ແລະ ອື່ນໆ.

II. ການສ້າງຄອກແບ້

ການສ້າງໂຮງເຮືອນ ແລະ ຄອກແບ້ ເປັນເຕັກນິກໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ຍ້ອນວ່າ: ຖ້າຄອກແບ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສິ່ງຜິດພ່ອງສຸຂະພາບແບ້ໄດ້. ສະນັ້ນ, ຂະໜາດຂອງຄອກແບ້ ຄວາມສູງຂອງຄອກ ແລະ ພື້ນຄອກ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ. ຂໍ້ແນະນຳຂັ້ນພື້ນຖານສຳລັບການສ້າງຄອກແບ້ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ✓ ຄອກແບ້ຄວນຕັ້ງຢູ່ພື້ນທີ່ສູງ ບໍ່ມີນ້ຳຖ້ວມ
- ✓ ຄວນສ້າງຄອກແບ້ຢູ່ບໍລິເວນທີ່ມີອາກາດປອດໂປ່ງ ແລະ ຖ່າຍເທດີໄດ້ດີ
- ✓ ຄອກແບ້ບໍ່ຄວນຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນທີ່ຮົ່ມເກີນໄປ, ຄວນຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນທີ່ມີແສງແດດສອງເຖິງໄດ້
- ✓ ແບ້ 1 ໂຕ ຕ້ອງການເນື້ອທີ່ 1 ຕາແມັດ, ຍົກຕົວຢ່າງ: ຖ້າມີແບ້ໜຶ່ງຝູງຈຳນວນ 12 ໂຕ ຄວນມີຄອກເນື້ອທີ່ 12 ຕາແມັດ ຫຼື ຂະໜາດຄອກ 3 ແມັດ x 4 ແມັດ ເປັນຕົ້ນ. ໃນນັ້ນ, ການຂັງແບ້ລວມກັນໃນຄອກໜຶ່ງ, ຄວນຄັດເອົາແບ້ທີ່ມີຂະໜາດດຽວກັນມາຂັງຢູ່ຝູງດຽວກັນ.
- ✓ ພື້ນຄອກແບ້ຄວນສູງຈາກຫນ້າດິນພື້ນສູງ (ຢ່າງໜ້ອຍ 1.2 ແມັດ)
- ✓ ພື້ນຄອກແບ້ຕ້ອງມີຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ອາກາດ (ຂີ້) ຂອງແບ້ຕົກລົງກ້ອງລ່າງ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ພື້ນຄອກແຫ້ງ ແລະ ສະອາດຢູ່ສະເໝີ
- ✓ ຄອກແບ້ຄວນມີຮາງອາຫານທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການໃຫ້ອາຫານແບ້
- ✓ ຄອກແບ້ຄວນມີທາງຢ່າງຂຶ້ນ-ລົງ ທີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນປະມານ 45 ອົງສາ

✓ ຝາຄອກແບ້ຄວນມີຄວາມສູງຢ່າງໜ້ອຍ 1.5 ແມັດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແບ້ໂດດອອກຫຼືປີນຂ້າມອອກໄປໄດ້
ຕົວຢ່າງ: ຮູບພາບຂອງຄອກແບ້ທີ່ເໝາະສົມໃນການລ້ຽງແບບຄອບຄົວ (ຈຳນວນໜ້ອຍ) ແລະ ການລ້ຽງແບບ
ເປັນເສດຖະກິດ (ຈຳນວນຫຼາຍໂຕ)



ອົງປະກອບການຮຽນ	ຈຳນວນໜ້າ: 03
ຊື່ອົງປະກອບການຮຽນທີ 3 : ເຕັກນິກການຄັດເລືອກແບ້ມາລ້ຽງ	
ຊື່ໂມດູນ: ເຕັກນິກການລ້ຽງແບ້	ລະຫັດ
ຊື່ອາຊີບ: ລ້ຽງສັດ	

ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ອະທິບາຍເຕັກນິກການຄັດເລືອກແບ້ເຂົ້າມາລ້ຽງ, ການກວດອາຍຸຂອງແບ້ ແລະ ການຄັດເລືອກພໍ່ແມ່ພັນແບ້ຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການທີ່ກຳນົດໄວ້

ພາກສະໜີ

ເຕັກນິກການຄັດເລືອກແບ້ມາລ້ຽງ ຈະລວມມີເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງເຕັກນິກຂັ້ນພື້ນຖານໃນການຄັດເລືອກແບ້ເຂົ້າມາລ້ຽງ, ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ການຄັດເລືອກ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການກວດອາຍຸຂອງແບ້

I. ເຕັກນິກການຄັດເລືອກແບ້ມາລ້ຽງ

ຢາກລ້ຽງແບ້ໃຫ້ປະສິບຜົນສຳເລັດ, ອີກປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນເບື້ອງຕົ້ນກໍ່ແມ່ນການຄັດເລືອກແນວພັນ ຫຼື ພໍ່ພັນ-ແມ່ພັນແບ້ທີ່ດີ, ຖ້າຫາກມີການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດທີ່ດີ



ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຄວນຄຳນຶງໃນການຄັດເລືອກແບ້ ຄວນມີດັ່ງນີ້:

- ຄວນເລືອກແບ້ທີ່ລ້ຽງງ່າຍ ແລະ ທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ, ສະນັ້ນ ຄວນເລີ່ມຕົ້ນຈາກການລ້ຽງແບ້ພັນພື້ນເມືອງ ຫຼື ແບ້ລູກປະສົມທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມທ້ອງຖິ່ນ ຈິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລ້ຽງດູໄດ້ງ່າຍ.
- ອາຍຸ ແລະ ຂະໜາດຂອງແບ້ທີ່ພວກເຮົາຄວນນຳມາລ້ຽງໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ, ພວກເຮົາບໍ່ເລືອກເອົາແບ້ທີ່ອາຍຸອ່ອນເກີນໄປ ຫຼື ແກ່ເກີນໄປມາລ້ຽງ ແຕ່ຄວນເລືອກແບ້ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຢູ່ໃນໄວຈະເລີນພັນ, ເຊິ່ງມີອາຍຸປະມານ 8 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ບໍ່ຄວນມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 2 ປີ.
- ນ້ຳໜັກຂອງແບ້ພັນພື້ນເມືອງທີ່ຄວນນຳມາລ້ຽງເບື້ອງຕົ້ນຄວນຢູ່ລະຫວ່າງ 18-25 ກິໂລ/ໂຕ.

II. ເຕັກນິກການກວດອາຍຸແບ້


❑ ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ແບ້ມີອາຍຸເທົ່າໃດ?




ພວກເຮົາສາມາດກວດເບິ່ງອາຍຸຂອງແບ້ ໂດຍການສັງເກດເບິ່ງແຂ້ວທີ່ແບ້ມີຢູ່. ປົກກະຕິແບ້ຈະມີແຂ້ວດ້ານລຸ່ມທັງໝົດ

8 ເຫຼັ້ມ ເຊິ່ງຈະມີລາຍລະອຽດບົ່ງບອກຂອງມັນ ດັ່ງນີ້:

- ເມື່ອແບ້ເກີດມາໃໝ່ຈົນເຖິງອາຍຸ 1 ປີ, ແບ້ຈະມີແຂ້ວພຽງແຕ່ແຂ້ວນ້ຳນົມເທົ່ານັ້ນ
- ເມື່ອແບ້ມີອາຍຸ 1 ປີ ຂຶ້ນໄປ ພວກມັນຈະມີແຂ້ວແທ້ປົ່ງຂຶ້ນມາແທນແຂ້ວນ້ຳນົມເທື່ອລະຄູ່ ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 1 ປີ ຫາ 4 ປີ
- ຫຼັງຈາກແບ້ອາຍຸ 4 ປີແລ້ວ ແຂ້ວແທ້ຈະເລີ່ມຫຼົ່ນອອກ

ການກວດເບິ່ງອາຍຸຂອງແບ້
ໂດຍການເບິ່ງແຂ້ວ



ອາຍຸຂອງແບ້	ລັກສະນະຂອງແຂ້ວ
ລູກແບ້, ຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ	ມີແຂ້ວຕັດ 8 ເຫຼັ້ມ 
ແບ້ນ້ອຍ-ກາງ, 1-2 ປີ	ແຂ້ວແທ້ອອກມາ 2 ເຫຼັ້ມທາງໜ້າ 
ແບ້ໃຫຍ່, 2-3 ປີ	ແຂ້ວແທ້ມີ 4 ເຫຼັ້ມ 
ແບ້ໃຫຍ່, 3-4 ປີ	ແຂ້ວແທ້ມີ 6-8 ເຫຼັ້ມ 
ແບ້ໃຫຍ່, 4 ປີ ຂຶ້ນໄປ	ແຂ້ວແທ້ມີ 8 ເຫຼັ້ມ ເລີ່ມຫຼົ່ນ 
ແບ້ເຖົ້າ, ຫຼາຍກວ່າ 5 ປີ	ແຂ້ວບາງເຫຼັ້ມເລີ່ມຫຼົ່ນ 

ຕົວຢ່າງ: ແບ້ມີອາຍຸ 2-3 ປີ ຕ້ອງມີ

ແຂ້ວລັກສະນະແບບນີ້:



III. ການເລືອກຜໍ່-ແມ່ຜັນ

- ການເລືອກຜໍ່-ແມ່ຜັນ: ຄວນຄັດເລືອກຜໍ່ຜັນທີ່ມີສາຍເລືອດຜັນແທ້, ຮູບຮ່າງສູງໃຫຍ່, ນ້ຳໜັກໂຕຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຝູງ, ມີຄວາມແຂງແຮງ, ມີຄວາມສົມບູນຜັນ ໂດຍຄວນຄັດຜໍ່ແບ້ທີ່ເກີດຈາກແມ່ແບ້ທີ່ໃຫ້ລູກແຝດ 2 ໂຕ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຜໍ່ຜັນແບ້ຄວນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະປະສົມຜັນກັບແບ້ແມ່ເມື່ອເວລາຂຶ້ນເຝດ.
- ສຳລັບ ການຄັດເລືອກແມ່ຜັນ, ນອກຈາກຄັດເລືອກລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບແບ້ຜໍ່ທີ່ກ່າວມານັ້ນແລ້ວ ຄວນສັງເກດຄວາມສະໝ່ຳສະເໝີຂອງເຕົ້ານົມແບ້ອີກດ້ວຍ.

ຕົວຢ່າງ: ຮູບຮ່າງຂອງແບ້ທີ່ນຳມາເປັນຜໍ່-ແມ່ຜັນ



ອົງປະກອບການຮຽນ	ຈຳນວນໜ້າ: 9
ຊື່ອົງປະກອບການຮຽນທີ 4 : ວິທີການລ້ຽງ ແລະ ການຈັດການ	
ຊື່ໂມດູນ: ເຕັກນິກການລ້ຽງແບ່	ລະຫັດ
ຊື່ອາຊີບ: ລ້ຽງສັດ	

ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ອະທິບາຍໄດ້ເຖິງວິທີການລ້ຽງ, ການຈັດການຝູງແບ່, ການດູແລຮັກສາແບ່ນ້ອຍເກີດໃໝ່, ການດູແລຮັກສາແບ່ຫຼັງການຢ່າງນົມ, ການດູແລຮັກສາ ແລະ ການຈັດການການລ້ຽງແບ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະຖືກຕ້ອງຕາມ ຫຼັກການລ້ຽງແບ່ທີ່ກຳນົດໄວ້.

ພາກສະໜີ

ວິທີການລ້ຽງ ແລະ ການຈັດການ ຈະລວມມີເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຮູບແບບການລ້ຽງແບ່ປະເພດ ຕ່າງໆ, ການຈັດການຝູງສັດລ້ຽງ, ການກວດສອບແບ່ຖືຜາ, ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ການລ້ຽງແບ່ນ້ອຍເກີດໃໝ່, ແບ່ນ້ອຍ ນົມ ແລະ ເຕັກນິກການດູແລເອົາໃຈໃສ່ແບ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

1. ວິທີການລ້ຽງ

ວິທີການລ້ຽງແບ່ ທີ່ນິຍົມນຳໃຊ້ມີແບບໃດແດ່?



ການລ້ຽງແບ່ບູກລ່າມ



ການລ້ຽງແບ່ບ່ອຍ



ການລ້ຽງແບ່ຂັງຄອກ



ການລ້ຽງແບ່ປະສານກັບການປູກພືດ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ວິທີການລ້ຽງແບບທັງ 4 ແບບ ດັ່ງຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນຊາວກະສິກອນນິຍົມນຳໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະ ວິທີການລ້ຽງປ່ອຍ ເຊິ່ງວິທີການລ້ຽງແບບນີ້ ຜູ້ລ້ຽງແບບນີ້ຈະປ່ອຍໃຫ້ແບ້ອອກໄປຫາກິນອາຫານໃນເວລາກາງເວັນ ແລ້ວແບ້ກັບຄືນມາຄອກຕອນແລງ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງມີວິທີການລ້ຽງແບບປະສົມປະສານ ທີ່ນິຍົມນຳໃຊ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເຊິ່ງການລ້ຽງແບບລັກສະນະນີ້ ຜູ້ລ້ຽງຈະລ້ຽງແບ້ໃນຝັ່ງທີ່ງານປູກຝັດເສດຖະກິດຊະນິດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການປູກໄມ້ວິກ, ປູກຢາງຟາລາ,



ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຍືນຕົ້ນປະເພດອື່ນໆ. ໂດຍທີ່ວ່າແບ້ຈະສາມາດຫາກິນອາຫານທີ່ເປັນວັດຊະຜົດ ຫຼື ຜົດອາຫານສັດ ທີ່ປູກປະສົມປະສານໃນຝັ່ງທີ່ດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກຄວນມີຂະໜາດໃຫຍ່ສົມຄວນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແບ້ທຳລາຍໄດ້, ການລ້ຽງແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນການສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າການປູກຝັດພຽງຢ່າງດຽວ.


II. ການຈັດການ

1. ວິທີການຈັດການຝູງແບ້

ຖ້າຫາກມີແບ້ຝູງໃຫຍ່ມີແບ້ຫຼາຍໆຂະໜາດ, ອາຍຸແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີທັງເພດຜູ້ & ເພດແມ່ຢູ່ຮ່ວມກັນ, ວິທີການຈັດການ ແລະ ດູແລແບ້ເພດຜູ້ ແລະ ເພດແມ່ແມ່ນປະຕິບັດແບບຄ້າຍຄືກັນ. ແຕ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລ້ຽງແບ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ, ຄວນແຍກລ້ຽງ ແລະ ຂັງ ເມື່ອແບ້ເພດຜູ້ ແລະ ເພດແມ່ ເມື່ອແບ້ມີອາຍຸ 3 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ. ວິທີນີ້ສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ແບ້ຈະປະສົມພັນແບ້ໄວເກີນໄປ (ກ່ອນກຳນົດ). ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບດີ ທັງແບ້ຜູ້ ແລະ ແບ້ແມ່ ຄວນປະສົມພັນຄັ້ງທຳອິດ ເມື່ອພວກມັນມີອາຍຸ 8 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ.



ທ່ານຄິດວ່າ ຝູງແບ້ ຫຼື ງ່າງຄວນມີແບ້ໂຕຜູ້ຈັກ



ແບ້ເພດຜູ້ທີ່ຄວນເລືອກເປັນພໍ່ພັນຕ້ອງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ສົມບູນ ແລະ ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 8 ເດືອນຂຶ້ນໄປ.

ໂຕ ແລະ ໂຕແມ່ຈັກໂຕ
ຈຶ່ງຈະໝາະສົມ?

ແບ້ຜູ້ທີ່ນຳມາເປັນພໍ່ພັນ 1 ໂຕ ສາມາດຄຸມຝູງກັບແບ້ແມ່ໄດ້
ສູງສຸດເຖິງ 20 ໂຕ

ໝາຍຄວາມວ່າ: ແບ້ຜູ້ 1 ໂຕ ຕໍ່ແບ້ແມ່ 20 ໂຕ.

ແຕ່ຖ້າແບ້ຜູ້ທີ່ສົມບູນຈະສາມາດປະສົມໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ວັນ, ແບ້
ຜູ້ຄວນມີອາຍຸ 1 ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ບໍ່ຄວນເກີນ 4 ປີ.

ແບ້ແມ່ອາຍຸເທົ່າໃດຈຶ່ງ
ສາມາດຖືພາໃຫ້ລູກໄດ້?

ແບ້ແມ່ 8 ເດືອນຂຶ້ນໄປ
ຈະເລີ່ມຂຶ້ນເພດ ໂດຍສະແດງ
ອາການຫຼຸດຫງິດ, ບໍ່ກິນອາຫານ,
ຢືນຊຶງ ຫຼື ໄລ່ຂຶ້ນໂຄມແບ້ໂຕອື່ນໆ.
ຮອບວຽນຂຶ້ນເພດຂອງແບ້ແມ່ນທຸກໆ
21 ວັນ ແລະ ໃຊ້ເວລາ 3 ວັນ ໃນ
ແຕ່ລະເທື່ອທີ່ຂຶ້ນເພດ. ເມື່ອແບ້ຂຶ້ນເພດ
ກໍ່ສະແດງວ່າພວກມັນສາມາດປະສົມ
ພັນ ແລະ ຖືພາມີລູກໄດ້

ເມື່ອແບ້ມີອາຍຸ 1 ປີ ຂຶ້ນ
ໄປ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຖືພາ, ມີ
ຮ່າງກາຍບໍ່ສົມບູນ, ຈ່ອຍ
ຫຼື ມັກເຈັບປ່ວຍ ແມ່ນ
ຄວນຄັດອອກຈາກຝູງ

➤ ເຮົາຈະສັງເກດແນວໃດວ່າແບ້ຖືພາ ຫຼື ບໍ່?

ແບ້ແມ່ທີ່ປະສົມພັນຕິດແລ້ວ ແບ້ຈະຖືພາ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 150 ວັນ ຫຼື 5 ເດືອນ ເຊິ່ງສາມາດສັງເກດລັກສະນະຂອງແບ້ຖືພາດັ່ງນີ້:

- ບໍ່ມີອາການຂຶ້ນເພດ ແລະ ເຕົ້ານົມເລີ່ມໃຫຍ່ກວ່າປົກກະຕິ
 - ເມື່ອແບ້ຖືພາໃກ້ຈະເກີດ ແບ້ຈະສາມາດອາການດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 - ສະແດງອາການຫຼຸດຫງິດ, ຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຮ້ອງສຽງຕ່ຳໆ
 - ບໍລິເວນກະໂພກເບື້ອງຂວາຈະຍຸບເປັນຫູມກ່ອນ, ຈາກນັ້ນ ຈະເຫັນຮອຍຍຸບເປັນຫູມຊັດເຈນຂຶ້ນໃນບໍລິເວນກະໂພກທັງສອງຂ້າງ
 - ອາດຈະມີນ້ຳເມືອກໄຫຼອອກມາຈາກຊ່ອງຄອດເລັກນ້ອຍກ່ອນການເກີດຫຼາຍວັນ, ຈາກນັ້ນ ຈະສັງເກດເຫັນນ້ຳເມືອກເປັນຊຸ່ນໆຂຶ້ນ ແລະ ມີສີເຫຼືອງອ່ອນໆ.
 - ແບ້ອາດຈະຄຸ້ຍເຂ່ຍຫຍ້າ ຫຼື ເຝືອງ ອ້ອມໆຂ້າງຕົວມັນເອງຄ້າຍກັບຈະກຽມເກີດລູກ
 - ແມ່ແບ້ຈະຫຼຸດຫງິດຫຼາຍຂຶ້ນທັນທີ, ບິດດຽວນອນ ບິດດຽວລຸກ ແລ້ວນອນລົງແບບຄ່ອຍໆ
 - ເມື່ອແມ່ແບ້ສະແດງອາການດັ່ງກ່າວ ຄວນປ່ອຍແບ້ຢູ່ແບບງຽບໆ ຢ່າໃຫ້ມັນຖືກລົບກວນ
 - ກຽມຜ້າແຫ້ງ ແລະ ດ້າຍເຜື່ອຜູກສາຍບີ ໃຊ້ມືດໂກນ ແລະ ທິງເຈົ້າໂອໂອດົນໄວ້, ເມື່ອຖືງນ້ຳຄາວປາແຕກແລ້ວ ແບ້ຈະເກີດລູກພາຍໃນ 1 ຊົ່ວໂມງ
 - ແຕ່ຖ້າຫາກ ແມ່ແບ້ເບິ່ງນານເກີນໄປແລ້ວຍັງບໍ່ເກີດ ຄວນຕ້ອງຊ່ວຍແມ່ແບ້ໂດຍໃຫ້ມັນຢືນຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ແບ້ເກີດງ່າຍຂຶ້ນ.



ພວກເຮົາຄວນດູແລຮັກສາ
ແບ້ນ້ອຍເກີດໃໝ່ແນວໃດ?



- ເມື່ອແບ້ນ້ອຍເກີດອອກມາແລ້ວ ຄວນໃຊ້ຜ້າທີ່ກຽມໄວ້ເຊັດໃຫ້ແຫ້ງ ໂດຍເຊັດນ້ຳເມືອກໃນບໍລິເວນດັ່ງອອກໃຫ້ໝົດ ເພື່ອໃຫ້ລູກແບ້ຫາຍໃຈສະດວກຂຶ້ນ.

- ຄວນມັດສາຍບີຫ່າງຈາກທ້ອງປະມານ 2-3 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວຕັດສາຍບີ ແລະ ທາທິງເຈົ້າໂອໂອດິນ, ເມື່ອຕັດສາຍບີແລ້ວກໍອຸ້ມແບ້ນ້ອຍໄປນອນທີ່ກະກຽມໄວ້ຕ່າງຫາກ.
- ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ເອົາແບ້ນ້ອຍໄປຕາກແດດໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ແບ້ນ້ອຍໂຕແຫ້ງ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ນ້ອຍມີຄວາມແຂງແຮງຂຶ້ນ.
- ປົກກະຕິແລ້ວ ແຮ່ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ແບ້ຈະອອກມາພາຍໃນ 4 ຊົ່ວໂມງ ພາຍຫຼັງຈາກການເກີດ,
- ແຕ່ຖ້າເກີນ 6 ຊົ່ວໂມງແລ້ວ, ແຮ່ຍັງບໍ່ອອກມາ ຈະຕ້ອງປົກສາສັດຕະວະແພດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້.
- ຫຼັງຈາກແບ້ເກີດລູກແລ້ວ ໃຫ້ເອົານ້ຳສະອາດມາໃຫ້ແມ່ແບ້ກິນ ເພື່ອທົດແທນຂອງແຫຼວໃນຮ່າງກາຍທີ່ສູນເສຍໄປ.

ຄວນໃຫ້ແບ້ນ້ອຍເກີດໃໝ່ ກິນນົມນ້ຳເຫຼືອງນ້ຳແມ່, ແບ້ນ້ອຍຄວນໄດ້ກິນນົມນ້ອຍຕະຫຼອດເວລາ, ສະນັ້ນ ໄລຍະນີ້ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ອາຫານແກ່ແມ່ແບ້ເປັນພິເສດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໃນກໍລະນີທີ່ແບ້ເກີດລູກແຜດ 3 ໂຕ, ຜູ້ລ້ຽງຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນການເຮັດໃຫ້ແບ້ນ້ອຍໄດ້ກິນນົມແມ່ຢ່າງພຽງພໍ, ເຊິ່ງອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຊື້ນົມຜົງມາແຕ່ງໃຫ້ແບ້ນ້ອຍກິນບາງຄັ້ງຄາວ.

2. ວິທີການດູແລຮັກສາແບ້ນ້ອຍຫຼັງຢ່າງນົມ



ທາງທີ່ດີຄວນລ້ຽງຢູ່ກັບແມ່ ແລ້ວແຍກອອກຈາກກັນເມື່ອແບ້ນ້ອຍມີອາຍຸ 2-3 ເດືອນ. ເມື່ອແບ້ນ້ອຍມີອາຍຸ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ, ຜູ້ລ້ຽງສາມາດຄັດເລືອກເອົາແບ້ທີ່ມີຄວາມສົມບູນໄວ້ເປັນພໍ່-ແມ່ພັນໄດ້, ຫຼື ສາມາດຕອນແບ້ຜູ້ໄດ້ໃນຊ່ວງອາຍຸນີ້ໄດ້ເຊັນກັນ.

ພາຍຫຼັງແບ້ນ້ອຍຢ່ານົມ ຄວນຖ່າຍແມ່ທ້ອງ ໂຕກົມ, ໂຕຕິດ ແລະ ພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ, ສັກວັກ ຊົນປ້ອງກັນພະຍາດປາກເປື້ອຍລົງເລັບ ແລະ ພະຍາດ ເຕົ້າໂຮມເລືອດ.

ການຖ່າຍແມ່ທ້ອງ ແລະ ສັກວັກຊົນຢ່າງສະໝໍ າສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ແບ້ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ສາມາດປະສົມ ພັນໄດ້ເມື່ອອາຍຸ 8 ເດືອນ.

ຄວນເອົາໃຈໃສ່ອາຫານທີ່ແບ້ຢ່ານົມກິນຢ່າງ ພິເສດ, ບໍ່ຄວນໃຫ້ແບ້ໄລຍະນີ້ກິນອາຫານຈຳພວກພືດ ຕະກູນຖົ່ວ ຫຼື ໃບມັນຕົ້ນ ຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະອາດຈະ ເຮັດໃຫ້ແບ້ນ້ອຍທ້ອງເບັງໄດ້ງ່າຍ.

ແມ່ແບ້ພາຍຫຼັງເກີດລູກແລ້ວປະມານ 3 ເດືອນ ເມື່ອຂຶ້ນເພດອີກຄັ້ງໃໝ່ ແລ້ວກໍ່ສາມາດປະສົມ ພັນໄດ້ຄັ້ງໃໝ່ອີກ.



3. ການດູແລຮັກສາ ແລະ ການຈັດການ ແບ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ແບ້ປ່ວຍ ຫຼື ແບ້ບໍ່ສະບາຍ

- ເມື່ອແບ້ບໍ່ສະບາຍ, ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ອາຫານ ທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແບ້ແຂງແຮງຂຶ້ນ
- ແບ້ທີ່ອ່ອນເພຍ ຫຼື ແບ້ປ່ວຍ ຄວນແຍກອອກຈາກຝູງແລ້ວອາຫານຕ່າງຫາກ
- ຄວນມີການຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ອາຫານທີ່ດີແກ່ແບ້ ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ (ຜູ້ລ້ຽງຕ້ອງໄດ້ ຊອກຫາອາຫານໃຫ້ແບ້ກິນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນການໃຫ້ອາຫານແບ້)




ແບ້ນ້ອຍເກີດໃໝ່ ຈົນເຖິງອາຍຸ 3 ເດືອນ

- ❑ ແບ້ນ້ອຍເກີດໃໝ່, ຄວນໃຫ້ກິນນ້ຳນົມເຫຼືອງ ຈາກແມ່ແບ້ ພາຍໃນ 24-48 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີພູມຄຸ້ມກັນທີ່ດີ
- ❑ ໃຫ້ແບ້ນ້ອຍສາມາດກິນນົມນ້ຳແມ່ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ
- ❑ ແບ້ນ້ອຍອາຍຸ 3 ອາທິດຂຶ້ນໄປ, ນອກຈາກການກິນນົມແມ່ແລ້ວ, ແບ້ຄວນເລີ່ມໃຫ້ ອາຫານທີ່ສະອາດປະເພດໃບພືດເຊັ່ນ: ໃບຖົ່ວ, ໃບມັນດ້າງ, ໃບພືດຕ່າງໆທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍເລີ່ມຈາກໜ້ອຍຫຼາຍ



ແບ້ທີ່ກຳລັງຈະເລີນເຕີບໂຕ

- ແບ້ອາຍຸ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ (ຫຼັງຈາກຢ່າງນົມ), ຄວນໃຫ້ອາຫານທີ່ສົດ, ສະອາດ ແລະ ມີທາດອາຫານສູງ
- ໃຫ້ນ້ຳສະອາດແລະແຮ່ທາດຕະຫຼອດເວລາເພື່ອໃຫ້ແບ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ
- ໃຫ້ອາຫານພຽງພໍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແບ້ໃຫຍ່ໄວ, ຄວນໃຫ້ອາຫານເສີມຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງ ທຸກໆມື້ໃນປະລິມານ 100-200 ກຸກມ/ໂຕ/ວັນ
- ອາຫານເສີມໄດ້ແກ່: ໃບຖົ່ວ, ໃບກະຖິນ, ໃບທອງ, ໃບໝາກມື້,... ນອກນັ້ນຍັງມີອາຫານເສີມປະເພດຫົວມັນຕົ້ນແຫ້ງ, ຫົວມັນດ້າງແຫ້ງ, ຮ່າ,...ຫຼື ອາຫານສຳເລັດຮູບ



ແບ້ພໍ່ພັນ-ແມ່ພັນ

- ✓ ພໍ່ພັນແບ້ຄວນໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ດີ ແລະ ພຽງພໍ, ຄວນໃຫ້ 3-5 ກິໂລ ຕໍ່ໂຕຕໍ່ມື້
- ✓ ຄວນແຍກພໍ່ພັນແບ້ອອກຈາກຝູງມື້ລະ 2-3 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ແບ້ໄດ້ກິນອາຫານຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ແບ້ພໍ່ພັນຄວນມີກ້ອນແຮ່ທາດໄວ້ ກິນຢ່າງເຕັມທີ່

ສຳລັບແມ່ພັນ: ຄວນໃຫ້ອາຫານທີ່ດີ ແລະ ພຽງພໍ ສຳລັບແບ້ທີ່ກຽມຖືພາ

- ❖ ຄວນໃຫ້ອາຫານຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເມື່ອແບ້ຖືພາໄດ້ 2 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ, ຄວນອາຫານເສີມຢ່າງໜ້ອຍ 200 ກຸກມ/ໂຕ/ວັນ
- ❖ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ອາຫານແມ່ຫຼັງຈາກເກີດລູກ ແລະ ລ້ຽງລູກໜ້ອຍ ໄລຍະ 2 ເດືອນທຳອິດ ຕ້ອງມີອາຫານຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ໃຫ້ແບ້ໄດ້ກິນຢ່າງເຕັມທີ່



ການດູແລຮັກສາ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານແບ່ແມ່ລູກອ່ອນ

ຄວນດູແລເບິ່ງແຍງແບ່ແມ່ເກີດລູກໃໝ່ ແລະ ລູກຂອງມັນ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈາກອັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ແບ່ ແລະ ແບ່ນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ໝາ ແລະ ສັດອື່ນໆ

- ຄວນຂັງໄວ້ໃນຄອກສະອາດ ຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ອາທິດ, ພ້ອມທັງ ອາຫານທີ່ດີເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ມີນ້ຳສະອາດ ໃຫ້ແບ່ແມ່ໄດ້ກິນຢູ່ ຕະຫຼອດເວລາ
- ການໃຫ້ແຮ່ທາດແກ່ແບ່ແມ່ທີ່ເກີດໃໝ່ເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດ ສະນັ້ນ ຄວນໃຫ້ແຮ່ທາດລວມໃຫ້ແກ່ແບ່ ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີແຮ່ ທາດລວມ, ຢາກໜ້ອຍຜູ້ລ້ຽງຄວນເອົາເກືອໃຫ້ແບ່ແມ່ລູກອ່ອນ ໄດ້ເລຍກິນ



ອົງປະກອບການຮຽນ	ຈຳນວນໜ້າ: 06
ຊື່ອົງປະກອບການຮຽນ 5 : ເຕັກນິກການໃຫ້ອາຫານແບ້	
ຊື່ໂມດູນ: ເຕັກນິກການລ້ຽງແບ້	ລະຫັດ
ຊື່ອາຊີບ: ລ້ຽງສັດ	

ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດຳເນີນການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ການເຮັດອາຫານເສີມສຳລັບແບ້ໄດ້ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກການໃຫ້ອາຫານແບ້ທີ່ກຳນົດໃນຄູ່ມື

ຜາກສະເໜີ

ເຕັກນິກການໃຫ້ອາຫານ ຈະລວມມີເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານສຳລັບແບ້ຂັ້ນຜື້ນຖານ, ການເຮັດກ້ອນແຮ່ທາດອາຫານເສີມ ແລະ ປະລິມານອາຫານທີ່ຄວນໃຫ້ແບ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.



I. ເຕັກນິກການໃຫ້ອາຫານແບບ

*****ແບບມີນິໄສທີ່ມັກກິນອາຫານທີ່ຢູ່ສູງກວ່າຫົວຂອງມັນ ການໃຫ້ອາຫານແກ່ແບບເມື່ອຢູ່ໃນຄອກ, ຄວນຫ້ອຍໄວ້ສູງ ຫຼື ເອົາອາຫານໃສ່ຮາງອາຫານ**

***ແບບມີນິໄສທີ່ມັກກິນອາຫານແບບລວມຝູງ, ສະນັ້ນ ການໃຫ້ອາຫານແບບເປັນຝູງຈະເຮັດໃຫ້ແບບກິນອາຫານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

***ແບບມີພຶດຕິກຳທີ່ເລືອກກິນອາຫານຫຼາຍຊະນິດ, ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຄວນໃຫ້ແບບໄດ້ກິນອາຫານຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໃບໄມ້ຝຸ່ມ, ໃບພືດຊະນິດຕ່າງໆ, ຫຍ້າ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກກະສິກຳ, ອາຫານເສີມ ແລະ ອື່ນໆ

***ແບບມີນິໄສທີ່ມັກສະອາດ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວນເອົາອາຫານ ແລະ ນ້ຳສະອາດໃຫ້ແບບກິນຢູ່ສະເໝີ



ອາຫານທີ່ດີຂອງແບບແມ່ນຫຍັງ?

- ອາຫານທີ່ດີຄື: ອາຫານທີ່ແບບມັກກິນ, ກິນແລ້ວໃຫຍ່ໄວ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແບບ!



II. ອາຫານເສີມສໍາລັບແບ້

ໃນການລ້ຽງແບ້ແບບປ່ອຍ, ນອກຈາກທີ່ແບ້ຈະຊອກຫາກິນເອງແລ້ວ ການໃຫ້ອາຫານເສີມ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ອາຫານເສີມຍັງຈໍາເປັນຕໍ່ແບ້ກໍາລັງຖືພາ, ເກີດລູກໃໝ່, ແບ້ທີ່ກໍາລັງປ່ວຍ ຫຼື ແບ້ທີ່ອ່ອນເພຍ.

ອາຫານເສີມທີ່ດີ ແລະ ໃຫ້ປະໂຫຍດສູງແກ່ແບ້ໄດ້ແກ່: ໃບຟິດຊະນິດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໃບທອງ, ໃບມ້, ໃບກະທັນ, ໃບກະຖິນ, ໃບມັນຕື້ນ (ແຫ້ງ), ໃບມອນ, ໃບຕອນ, ໃບຂາມ ແລະ ໃບໄມ້ທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນຊະນິດຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີອາຫານເສີມສໍາເລັດຮູບ, ຟິດຫົວ ແລະ ຟິດທັນຍາຫານເຊັ່ນ: ຫົວມັນຕື້ນແຫ້ງ, ຫົວມັນດ້າງແຫ້ງ, ສາລີ, ຮໍາ, ແລະ ອື່ນໆ

ອາຫານເສີມປະເພດຕ່າງໆ





ນອກຈາກບັນດາອາຫານເສີມປະເພດໃບຜິດ, ຜິດຫົວ, ຜິດທັນຍາຫານ ຫຼື ອາຫານສຳເລັດຮູບແລ້ວ, ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນອີກຢ່າງໜຶ່ງຄື **ການເສີມແຮ່ທາດ!** ນັ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າ ແບ້ຈະອ່ອນແອ, ຄໍ່ອຽງ, ຢ່າງໝູນເປັນວົງກົມ, ລົ້ມລົງ ນອນສະແຄງ, ທ້ອງເບັ້ງ ຫຼື ຖ້າມີອາການຮຸນແຮງແບ້ອາດຈະຕາຍໄດ້, ຖ້າວ່າ ແບ້ບໍ່ໄດ້ຮັບແຮ່ທາດພຽງພໍກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກມັນ.

ສະນັ້ນ ຄວນມີແຮ່ທາດແບບກ້ອນໄວ້ໃນຄອກແບ້ ເພື່ອໃຫ້ແບ້ໄດ້ເລຍກິນຕະຫຼອດເວລາ. ລາຍລະອຽດຂອງການເຮັດກ້ອນແຮ່ທາດມີດັ່ງນີ້:

III. ການຜະລິດອາຫານເສີມ(ເຮັດກ້ອນແຮ່ທາດ)

ວິທີການເຮັດກ້ອນແຮ່ທາດ



ສ່ວນປະສົມໃນຮູບກ້ອນແຮ່ທາດ

ສ່ວນປະສົມ	ສູນ 1 (%)	ສູນ 2 (%)	ສູນ 3 (%)	ສູນ 4 (%)	ສູນ 5 (%)
ຂົ່ກ	35	27	23	35	24
ຂີ້ເສຍກາ	-	4.5	10	10	10
ປຸຍ-ລ້ຽງ	5	5	5	8	5
ກີດ	3.4	5	8.5	8.5	10
ປຸນຂາວ	4	3	5	5	5
ຊີມັງ	10	10	10	10	12
ກາກນ້ຳຕານ/ ວິຕາມິນ	2	5	3	3	3.5
ກາກນ້ຳຕານ	40	40	35	20	30
ມາດ	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5

ຂັ້ນຕອນການປະສົມ

- ນ້ຳ(1/3)+ປຸນຂາວ+ດິນດາກ ປະໄວ້ໃຫ້ເໝືອນ(1)
- ນ້ຳທີ່ເຫຼືອ+ກາກນ້ຳຕານ(ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ) ປະສົມປຸຍລ້ຽງ, ເກືອ, ກະດູກບົດ, ຊີມັງ. (ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ) (2)
- ຕື່ມສ່ວນທີ່ແຂງດິນດາກລົງໄປ (ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ)(1+2)
- ສຸດທ້າຍໃສ່ຮ້າລົງໄປເພື່ອຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ
 - ນ້ຳສ່ວນປະສົມລົງແບບ(ຕົ້າໃຫ້ແທ້ໆ)
 - ຖອດແບບອອກເພື່ອນ້ຳໄປປົກລົມ
 - ແຫ້ງດີເລີຍ (2-3ມື້) ນ້ຳໄປໃຫ້ລັດກິນ

ອັດຫຼືຕົ້າໃຫ້ແທ້ໆ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ



ຮູບຮ່າງກ້ອນແຮ່ທາດ

ການນຳມາໃຫ້ລັດກິນ



ປະລິມານອາຫານທີ່ຄວນໃຫ້ແບ່ງໃນແຕ່ລະໄລຍະ	
ອາຍຸ/ໄລຍະ	ອາຫານ ແລະ ປະລິມານທີ່ໃຫ້ຕໍ່ວັນ
ເກີດໃໝ່-3 ວັນ	ນ້ຳນົມເຫຼືອງເຕັມທີ່ ຢ່າງໜ້ອຍວັນລະ 3-5 ຄັ້ງ
4 ວັນ -2 ອາທິດ	- ກິນນ້ຳນົມແມ່ຢ່າງເຕັມທີ່ ຫຼື ກໍລະນີທີ່ແຍກລ້ຽງຈາກແມ່ແບ່ງ ຕ້ອງໃຫ້ນົມສົດປະມານ 0.5-1 ລິດ ຕໍ່ວັນ ແບ່ງອອກເປັນວັນລະ 3 ຄັ້ງ - ວິຕາມິນ+ແຮ່ທາດ ແລະ ນ້ຳ ໂດຍໃຫ້ແບບເຕັມທີ່
2-16 ອາທິດ	- ກິນນ້ຳແມ່ຢ່າງເຕັມທີ່ ຫຼື ກໍລະນີທີ່ແຍກລ້ຽງຈາກແມ່ແບ່ງ ຕ້ອງໃຫ້ນົມສົດ ຫຼື ນົມປະສົມປະມານ 0.5-1 ລິດ ຕໍ່ວັນ ແບ່ງອອກເປັນວັນລະ 2 ຄັ້ງ - ຫຍ້າແຫ້ງ ເຊິ່ງເປັນຫຍ້າປະສົມຖົ່ວ ຫຼື ຫຍ້າສົດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ, ວິຕາມິນ+ແຮ່ທາດ ແລະ ນ້ຳ ໂດຍໃຫ້ແບບເຕັມທີ່ - ອາຫານສຳເລັດຮູບມີໂປຼຕີນປະມານ 22 ເປີເຊັນ, ໂດຍເລີ່ມຈາກການໃຫ້ປະລິມານໜ້ອຍກ່ອນ ແລ້ວຄ່ອຍໆເພີ່ມປະລິມານຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
4 ເດືອນ-ໃຫ້ລູກ	- ອາຫານຫຍາບ ເຊັ່ນ: ຫຍ້າສົດ, ວິຕາມິນ+ແຮ່ທາດປະສົມ ແລະ ນ້ຳ ໂດຍໃຫ້ແບບເຕັມທີ່ - ອາຫານເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ມີໂປຼຕີນລວມ 18-20 ເປີເຊັນ ໂດຍໃຫ້ກິນໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 0.5 ກິໂລ/ໂຕ/ວັນ.
ແມ່ພັນທີ່ຖືຟາ, ແລະ ພໍ່ພັນ	- ອາຫານຫຍາບ, ວິຕາມິນ+ແຮ່ທາດປະສົມ ແລະ ນ້ຳ ໂດຍໃຫ້ແບບເຕັມທີ່ - ອາຫານເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ມີໂປຼຕີນລວມ 16-18 ເປີເຊັນ ໂດຍໃຫ້ກິນໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 0.2-0.7 ກິໂລ/ໂຕ/ວັນ.
ແມ່ພັນໄລຍະໃຫ້ນ້ຳນົມ	- ອາຫານຫຍາບ, ວິຕາມິນ+ແຮ່ທາດປະສົມ ແລະ ນ້ຳ ເຕັມທີ່ - ອາຫານເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ມີໂປຼຕີນລວມ 16-18 ເປີເຊັນ ຫຼື ກໍລະນີແບ່ງພັນນົມ, ປະລິມານອາຫານທີ່ກິນຈະຂຶ້ນກັບປະລິມານຂອງນ້ຳນົມທີ່ຮີດໄດ້ ເຊິ່ງອາຫານ 0.3-0.5 ກິໂລ/ນ້ຳນົມທີ່ຮີດໄດ້ 1 ລິດ.

ອົງປະກອບການຮຽນ	ຈຳນວນໜ້າ: 12
ຊື່ອົງປະກອບການຮຽນທີ 6 : ການຮັກສາສຸຂະພາບແບ້	
ຊື່ໂມດູນ: ເຕັກນິກການລ້ຽງແບ້	ລະຫັດ
ຊື່ອາຊີບ: ລ້ຽງສັດ	


ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອະທິບາຍກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ເກີດກັບແບ້ຂຶ້ນຝື້ນຖານ ໄດ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມຫຼັກການຮັກສາສຸຂະພາບແບ້ທີ່ກຳນົດໄວ້

ພາກສະເໜີ

ການຮັກສາສຸຂະພາບແບ້ ຈະລວມມີເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈັກການຕິດຕາມ ແລະ ສັງເກດແບ້ທີ່ມີສຸຂະພາບ ດີເປັນປົກກະຕິ ແລະ ແບ້ທີ່ເລີ່ມມີການອາການບໍ່ສະບາຍ (ຜິດປົກກະຕິ), ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ຈັກບາງຊະນິດພະຍາດທີ່ມັກເກີດກັບ ແບ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການປ້ອງກັນ, ພ້ອມທັງເຕັກນິກການປິ່ນປົວຂຶ້ນຝື້ນຖານ.

I. ການຮັກສາສຸຂະພາບແບ້



II. ເຮົາຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພະຍາດລະບາດໄດ້ແນວໃດ?

ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ດັ່ງນີ້ :

- 1) ການຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງໂຮງເຮືອນ ແລະ ຄອກສັດ
- 2) ນຳໃຊ້ອາຫານ ແລະ ໃຫ້ອາຫານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດ
- 3) ນຳໃຊ້ວິທີການລ້ຽງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ
- 4) ກໍລະນີມີແບ້ເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ແບ້ບໍ່ສະບາຍ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຢູ່ຮ່ວມກັບແບ້ທີ່ແຂງແຮງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ທີ່ແຂງແຮງ ສາມາດຕິດຕໍ່ພະຍາດຈາກແບ້ທີ່ປ່ວຍໄດ້
- 5) ແຍກສັດເຈັບອອກຈາກຝູງ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ສັດເຈັບປີ່ນປົວແບ້ທີ່ເຈັບປ່ວຍຈົນໃຫ້ຫາຍດີຈຶ່ງຍ້າຍເຂົ້າລວມຝູງ
- 6) ຕິດຕາມແບ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຖ້າມີແບ້ຊື່ເຂົ້າມາໃຫມ່ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມເປັນພິເສດ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ເປັນພະຍາດ ແລ້ວຈຶ່ງປ່ອຍເຂົ້າຝູງ

ການສັງເກດ ແລະ ຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງແບ້

ອາຍຸຂອງແບ້	ແບ້ທີ່ແຂງແຮງ/ ປົກກະຕິ	ແບ້ທີ່ບໍ່ແຂງແຮງ/ ຜິດປົກກະຕິ
ແບ້ເກີດໃໝ່ 	ເຄື່ອນໄຫວດີ ສາມາດຍືນໄດ້ 30-60 ນາທີ ການຫາຍໃຈປົກກະຕິ	ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ບໍ່ກິນນົມ ອ່ອນແອ ແລະ ສະແດງອາການໜາວ
ແບ້ອາຍຸ 1 ອາທິດ(ອາທິດທຳອິດ)	ເຄື່ອນໄຫວດີ ກິນປົກກະຕິ ແລ່ນຫັນ	ມັກນອນສະແດງອາການໜາວ ແລະ ສັ່ນ

ລູກແບ້ ອາຍຸ > 1 ອາທິດ 	ຢູ່ລວມຝູງກິນອາຫານດີ ແລ່ນຫັນດີຂຶ້ນລຽບງາມການຂັບ ຖ່າຍປົກກະຕິການເຄື່ອນໄຫວດີ	ຢູ່ໂຕດຽວ (ແຍກຝູງ) ເຫງົາອາຈົມ (ຂີ້)ແຫຼວ ເຄື່ອນໄຫວຊ້າ 
---	--	--

ແບ້ທີ່ໃຫຍ່ເຕັມທີ່  <u>ອາການປົກກະຕິ</u> ແຂງແຮງດີ ມັກແລ່ນເລາະຫາກິນເອງໄດ້ດີ ຢູ່ເປັນຝູງ ຂຶ້ນລຽບ, ສະອາດ ຕາສະອາດ ຫາງຕັ້ງ ດັງ ແລະ ໃບໜ້າປົກກະຕິ	<u>ອາການຜິດປົກກະຕິ</u> ກິນອາຫານບໍ່ດີ ບໍ່ມັກຢູ່ເປັນຝູງ/ແຍກອອກຈາກຝູງ ຫຸຜັບລົງ ຫາງຢ້ອນລົງລຸ່ມ ດັງ, ປາກ ແລະ ຕາແຫ້ງ ຫາຍໃຈຊ້າ 
--	--

ການຢູ່ລວມຝູງຂອງແບ້



III. ພະຍາດທີ່ມັກເກີດກັບແບ້

ພະຍາດປາກເປື້ອຍລົງເລັບ

ແບ້ຈະມີອາການຊຶມເຫງົາ, ນ້ຳລາຍໄຫຼຢຶດອອກມາ, ບໍ່ກິນອາຫານ, ບໍລິເວນປາກ ແລະ ແກ້ມບວມແດງ, ມີເມັດຕຸ່ມໃສ່ເປັນບາດແຜຢູ່ບໍລິເວນເລັບຕີນ ແລະ ຕີນ, ແບ້ຈະຢ່າງຂາຫ່າງຍ້ານການເຈັບປວດ. ຖ້າເກີດການແຊກຊ້ອນ, ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນບາດແຜ

ມີໜອງ, ເປັນຕຸ່ມໂພງແຕກອອກ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ນານເຊົາ

ຖ້າມີອາການຊ້ຳເຮື້ອ, ອາດຈະເກີດອາການເລືອດເປັນຝິດແລ້ວເຮັດໃຫ້ແບ້



ຕາຍໄດ້.

→ ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີພະຍາດອື່ນໆເຂົ້າມາແຊກຊ້ອນ ພະຍາດນີ້ກໍ່ຈະຫາຍດີໄດ້ເອງ ພາຍໃນ 21 ວັນ.



ການປິ່ນປົວ: ທຳຄວາມສະອາດບໍລິເວນບາດແຜດ້ວຍນ້ຳເກືອ, ນ້ຳສີ່ມ ຫຼື ນ້ຳຝາດ, ແລ້ວໃຊ້ຢາສະເປສີມັວງ ທຳບໍລິເວນບາດແຜທີ່ປາກ ແລະ ຕີນ ມື້ລະຄັ້ງ ແລະ ສັກຢາຕ້ານເຊື້ອ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຊກຊ້ອນ, ພ້ອມກັນນັ້ນຄວນຂໍຄຳແນະນຳຈາກ ສັດຕະວະແພດ.

ການປ້ອງກັນ: 1. ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດປາກເປື້ອຍລົງເລັບ ປີລະຄັ້ງ
2. ກັກກັນແບ້ທີ່ເອົາເຂົ້າມາໃໝ່ ເປັນເວລາ 14 ວັນ ຈົນແນ່ໃຈວ່າແບ້ບໍ່ເປັນພະຍາດນີ້ ແລ້ວຄອຍປ່ອຍເຂົ້າຝູງ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ:

ພະຍາດນີ້ເປັນພະຍາດທີ່ມັກລະບາດໃນຊ່ວງປ່ຽນລະດູ ແລະ ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງແບ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

ຖ້າແບ້ຕິດພະຍາດແຊກຊ້ອນ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ຕາຍໄດ້.

ແບ້ທີ່ຖືພາອາດຈະແທ້ງລູກ (ລູລູກ) ໄດ້, ເນື່ອງຈາກເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັດ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ໂດຍກົງ.



ພະຍາດປອດບວມ

ແບ້ທີ່ອ່ອນແອ ຫຼື ແບ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຂ້າແມ່ທ້ອງ ມັກຈະເກີດພະຍາດປອດບວມ

ພະຍາດນີ້ມັກເກີດຂຶ້ນ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອໄດ້ໄວໃນໄລຍະລະດູຝົນ ຍ້ອນແບ້ໄດ້ຮັບເຊື້ອພະຍາດຈາກນ້ຳ, ອາຫານ, ເຊື້ອພະຍາດໃນອາກາດ, ການຢູ່ລວມກັນຂອງຝູງແບ້ ທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດນີ້ (ຕິດຕໍ່ທາງລະບົບຫາຍໃຈ).



- ແບ້ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຈະສະແດງອາການອອກຄື: ເປັນໄຂ້, ມີນ້ຳມຸກ, ມີອາການຫອບ, ຫາຍໃຈສຽງດັງ, ໄອ. ຖ້າມີອາການຊຳເຮື້ອ ແບ້ຈະກາຍເປັນແບ້ຂອດ (ບໍ່ຂະຫຍາຍໂຕ) ແລະ ອ່ອນແອ.

- ແບ້ອາດຈະຕາຍເຖິງ 60-90% ໂດຍສະເພາະ ແບ້ນ້ອຍ

ຫຼັງຈາກຢ່າງນີ້ມຈະຕາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ການປິ່ນປົວ ແລະ ການປ້ອງກັນ:

ສັກຢາຕ້ານເຊື້ອຈຳພວກເປນີຊີລິນ, ອອກຊີເຕຟາໄຊຄຣິນ, ຄໍແຣມເຟນີໂຄນ ຊະນິດໃດໜຶ່ງກໍ່ໄດ້, ໃຫ້ສັກ 3-5 ວັນ ຕິດຕໍ່ກັນ ເພື່ອປິ່ນປົວແບ້ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ ພ້ອມທັງປຶກສາສັດຕະວະແພດເພື່ອຊ່ວຍໃນການປິ່ນປົວ.

ການປ້ອງກັນພະຍາດນີ້: ທຳຄວາມສະອາດບໍລິເວນໂຮງເຮືອນ, ຄອກແບ້ ແລະ ບໍລິເວນທີ່ແບ້ອາໄສຢູ່, ຝັນຄອກໃຫ້ແຫ້ງ, ຢ່າໃຫ້ຝົນສາດຖືກ ຫຼື ລົມພັດຕະຫຼອດເວລາ. ສະນັ້ນ ໂຮງເຮືອນ-ຄອກແບ້ຄວນຍົກຝືນໃຫ້ສູງປະມານ 1-1.5 ແມັດ.

ຖ້າມີແບ້ປ່ວຍຄວນແຍກອອກໄປຂັງໄວ້ຕ່າງຫາກ ເພື່ອປິ່ນປົວຈົນຫາຍດີແລ້ວຄອຍເອົາມາປ່ອຍໃສ່ຝູງເດີມ. ຄວນຂ້າແມ່ທ້ອງໃຫ້ແບ້ເປັນປະຈຳທຸກໆ 4-6 ອາທິດ ເພື່ອໃຫ້ແບ້ແຂງແຮງ ແລະ ຄວນດູແລແບ້ຫຼັງຈາກຢ່າງນີ້ເປັນພິເສດ ໂດຍໃຫ້ອາຫານເສີມທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ.

ພະຍາດທ້ອງເບັງ

ພະຍາດນີ້ເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການປ່ຽນອາຫານ ກະທັນຫັນ, ການກິນຫຍ້າອ່ອນ, ຝືດຕະກູນຖົ່ວ ຫຼື ອາຫານເຂັ້ມຊຸ່ນຫຼາຍ ເກີນໄປ ຫຼື ກິນອາຫານເປັນຝືດ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດໃນຊ່ວງຕົ້ນ ລະດູຝົນ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງອາດຈະເກີດຈາກຄວາມຄຽດເນື່ອງຈາກ ສະພາບແວດລ້ອມມີການປ່ຽນແປງໄວອີກດ້ວຍ.

ພະຍາດທ້ອງເບັງເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີການຜະລິດອາຍແກັດອອກມາ ໄວເກີນໄປເຮັດໃຫ້ລະບາຍອອກບໍ່ທັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທໍ່ທາງເດີນ ອາຫານອຸດຕັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກະເພາະເບັງໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລ້ວໄປບີບ ຮັດຫົວໃຈ ແລະ ປອດ ສະນັ້ນ ຜູ້ລ້ຽງຈະສາມາດສັງເກດໄດ້ວ່າ ຫົວໃຈແບ້ຈະເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິ, ແບ້ຫາຍໃຈລຳບາກ, ໂຕ

ແຂງ, ມີສຽງກັດແຂ້ວ, ຍືນຊຶງເຮັດຂາຈ່າງອອກ, ແບ້ຈະລົ້ມລົງເຮັດຂາແຂງຊຶ້ງຂຶ້ນ ແລ້ວອີກບໍ່ເທົ່າໃດ ຊົ່ວໂມງ (2-3 ຊົ່ວໂມງ) ສັດກໍ່ຈະຕາຍ.

ການປິ່ນປົວ:

- ໃນກໍລະນີບໍ່ທັນຮຸນແຮງ ໃຫ້ໄລ່ ຫຼື ກະຕຸ້ນໃຫ້ແບ້ລຸກຂຶ້ນຢ່າງ, ແລ່ນອ້ອມໄປມາ ຫຼື ຈູງແບ້ໃຫ້ຢ່າງ ໄປ-ມາ
- ແຍ່ທໍ່ເຂົ້າທາງປາກ ແລະ ຈົກເອົາອາຈົມອອກ ພ້ອມທັງເອົາປະເພດນ້ຳມັນຝືດ ຫຼື ນ້ຳອັດລົມໃຫ້ແບ້ ກິນ ເຊິ່ງອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະບາຍແກັດຢູ່ໃນທ້ອງແບ້ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ



- ໃນກໍລະນີເປັນຮຸນແຮງ, ຕ້ອງໄດ້ເຈາະສ້ວງບາງຂ້າງຊ້າຍ ຫຼື ຂ້າງກະເພາະ ໜັກ ດ້ວຍເຂັມໃຫຍ່ ຫຼື ເຂັມໂຕຮກາ

- ສັກ ຫຼື ຮ່າຍຢາຕ້ານເຊື້ອໃສ່ບໍລິເວນທີ່ແທງ

ການປ້ອງກັນ:

- ໃນຊ່ວງປ່ຽນລະດູການ (ລະດູແລ້ງຕໍ່ລະດູຝົນ) ຫຼື ໃນຊ່ວງລະດູທີ່ ຝົນຕົກໃໝ່ບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ສັດກິນຫຍ້າຂຽວປົ່ງໃໝ່ຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ກ່ອນປ່ອຍອອກທົ່ງຄວນໃຫ້ແບ້ໄດ້ກິນຫຍ້າແຫ້ງ ຫຼື ເຝືອງແຫ້ງກ່ອນຈຶ່ງ ປ່ອຍອອກໄປກິນຫຍ້າຂຽວ
- ບໍ່ປ່ອຍແບ້ເຊົ້າເກີນໄປໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ແລະ ລະດູໜາວ
- ບໍ່ໃຫ້ສັດກິນອາຫານຊຸ່ນຫຼາຍເກີນໄປ,
- ບໍ່ໃຫ້ກິນອາຫານເປັນຝືດ, ອາຫານເສຍຄຸນ, ບໍ່ປ່ຽນອາຫານກະທັນຫັນ



ພະຍາດຖອກທ້ອງ

ພະຍາດຖອກທ້ອງເປັນພະຍາດໜຶ່ງທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ສິ່ງ
ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ການລ້ຽງແບ້ ເຊິ່ງມີຫຼາຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້
ແບ້ຖອກທ້ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການປ່ຽນອາຫານ ຈາກ
ອາຫານແຫ້ງເປັນອາຫານສົດ ຫຼື ການກິນອາຫານທີ່ປຽກ
ຊຸ່ມຫຼາຍເກີນໄປ, ການກິນອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ
ຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍໆມື້, ການກິນອາຫານທີ່ເປັນພິດ ຫຼື ມີສິ່ງ
ປົນເປື້ອນມານຳ.

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງພົບວ່າ ແມ່ກາຝາກພາຍໃນບາງໂຕ
ສາມາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ແບ້ຖອກທ້ອງໄດ້ ໂດຍ
ສະເພາະ ໃນແບ້ນ້ອຍ

ພະຍາດຖອກທ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ອ່ອນເພຍ, ສູນເສຍນ້ຳ ແລະ ແຮ່ທາດໃນຮ່າງກາຍໄວທີ່ສຸດ ແລ້ວເມື່ອແບ້ມີອາການ
ຂາດນ້ຳໃນຮ່າງກາຍຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ຕາຍໄດ້.

ວິທີການປິ່ນປົວ

ຄວນກະກຽມນ້ຳລະລາຍແຮ່ທາດ ເພື່ອໃຫ້ກິນທົດແທນນ້ຳທີ່ສູນເສຍໄປ ໂດຍການປະສົມ ນ້ຳຕານ 6 ບ່ວງຊາ ແລະ
ເກືອ ເຄິ່ງບ່ວງຊາ ປະສົມກັບນ້ຳສະອາດ 1 ລິດ, ໃຫ້ແບ້ກິນຢ່າງໜ້ອຍ 500 ມິລິລິດ ຕໍ່ວັນ

ຄວນເອົາອາຫານປະເພດໃບໄມ້ທີ່ລົດຊາດຂົມ-ຝາດໃຫ້ແບ້ກິນ
ຖ້າແບ້ມີອາການໄຂ້ສູງ, ຕ້ອງໄດ້ສັກຢາຕ້ານເຊື້ອເພື່ອປິ່ນປົວຕື່ມ.



ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີພະຍາດແທ້ງຕິດຕໍ່ທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບແບ້ ເຊິ່ງພະຍາດນີ້ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ແບ້ແທ້ງລູກ (ລູກ
ລູກ) ເມື່ອແບ້ຖືພາປະມານ 6-8 ອາທິດ. ພະຍາດນີ້ສາມາດຕິດຕໍ່ໃສ່ຄົນໄດ້! ອາການຂອງແບ້ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຈະສັງເກດໄດ້
ຍາກ, ຕ້ອງໄດ້ກວດເລືອດເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຄວນມີການປ້ອງກັນແມ່ນດີທີ່ສຸດ ໂດຍການກວດເລືອດແບ້ທຸກໆປີ (ປີລະ
ຄັ້ງ) ແລະ ຕ້ອງໄດ້ທຳລາຍແບ້ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຖີ້ມ.

ວິທີການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄືການທຳລາຍແບ້ທີ່ເປັນພະຍາດ ແລະ ຄວນເບິ່ງປະຫວັດຂອງແບ້ກ່ອນນຳເອົາມາລ້ຽງ,
ບໍ່ຄວນເລືອກເອົາແບ້ທີ່ມີຝີ-ແມ່ເຄີຍມີປະຫວັດເປັນພະຍາດນີ້ມາກ່ອນ.

ກາຝາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ

- ❑ ກາຝາກ (ແມ່ທ້ອງ) ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນຜະລິດແບ້ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ
- ❑ ກາຝາກພາຍໃນເປັນບັນຫາຫຼາຍກວ່າກາຝາກພາຍນອກ
- ❑ ຖ້າແບ້ມີກາຝາກພາຍໃນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ມີພະຍາດອື່ນໆເຂົ້າມາແຊກຊ້ອນຂັ້ນຮຸນ
ແຮງແລ້ວເຮັດໃຫ້ແບ້ຕາຍໄດ້.
- ❑ ແຕ່ຖ້າມີປະລິມານໜ້ອຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຫລຸດລົງ, ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ແລະ ເປັນ
ພະຍາດອື່ນໆໄດ້ງ່າຍ
- ❑ ກາຝາກພາຍໃນທີ່ພົບເຫັນໃນແບ້ປະກອບມີຈຳພວກແມ່ທ້ອງໂຕກົມ, ແມ່ທ້ອງໂຕຕິດ ແລະ ແມ່
ທ້ອງໂຕແປ ເປັນຕົ້ນ.

ສິ່ງອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກກາຝາກພາຍໃນ

- ແມ່ທ້ອງເສັ້ນດ້າຍ: ສິ່ງອັນຕະລາຍກໍ່ຄືແມ່ທ້ອງຊະນິດນີ້ຈະດູດກິນເລືອດແບ້ ເຮັດໃຫ້ແມ່ເກີດຜະຍາດເລືອດຈາງ ແລະ ຖ້າມີອາການຮຸນແຮງ ແບ້ຈະມີອາການບວມນ້ຳກ້ອງຄາງ, ຝື້ນທ້ອງ ແລະ ຮ່າງກາຍບໍ່ຂະ ຫຍາຍ (ຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ), ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ, ຖອກທ້ອງ ຫຼື ທ້ອງເບັງ, ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຜະຍາດອື່ນໆຕໍ່າລົງ ແລະ ຕາຍໄດ້.
 - ອາການໃນແບ້ນ້ອຍຈະເປັນແບບກະທັນຫັນ ເພາະການເສຍເລືອດຢ່າງໄວວາ ໂດຍບໍ່ສະແດງອອກຂອງອາການເລືອດຈາງ.
 - ມີອາການຂອງລຳໄສ້ນ້ອຍອັກເສບ, ແບ້ຈະຖ່າຍອອກເປັນມຸກແຫຼວ, ຂົນຫຍາບກະດ້າງ, ຖອກທ້ອງ ບາງຄັ້ງມີເລືອດອອກມາກັບອາຈົມສັດ, ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ, ຈ່ອຍຜອມແຫ້ງ ແລ້ວຕາຍ.
- ແມ່ທ້ອງຕົວຕິດ: ມັກເກີດກັບແບ້ທີ່ມີອາຍຸ 6-8 ອາທິດ ຫຼື ແບ້ນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6 ເດືອນ ຈະຕິດແມ່ຜະຍາດນີ້ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີອາການຮຸນແຮງຫຼາຍກວ່າແບ້ໃຫຍ່.
 - ຖ້າແບ້ມີແມ່ຜະຍາດຈຳພວກນີ້ປະລິມານໜ້ອຍອາດຈະບໍ່ສະແດງອາການ ແຕ່ຖ້າມີຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ຕາຍໄດ້.
- ແມ່ຜະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ: ແບ້ຈະບໍ່ຢາກເຄື່ອນໄຫວ, ຫາຍໃຈລຳບາກ, ສະແດງອາການເຈັບປວດໃນບໍລິເວນທີ່ຖືກສຳຜັດ ແລະ ແມ່ຜະຍາດນີ້ເຮັດໃຫ້ການຍ່ອຍອາຫານບໍ່ໄດ້ດີ ແລ້ວສິ່ງຜິດຕ່ານຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແບ້ ແລະ ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ.
- ເຊື້ອບິດ: ແບ້ຈະສະແດງອາການເບື້ອອາຫານ, ສຸຂະພາບບໍ່ສົມບູນ, ທ້ອງວ່າງ, ອາຈົມມີກິ່ນເໝັນຫຼາຍ, ແບ້ຈະອ່ອນເພຍ ແລະ ຖ້າບໍ່ຮັກສາຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ຕາຍໄດ້ ເຊິ່ງເຫັນວ່າອັດຕາການຕາຍຂອງແບ້ຈາກແມ່ຜະຍາດນີ້ຂ້ອນຂ້າງສູງ.
 - ການປ້ອງກັນ ຄວນແຍກແບ້ທີ່ເປັນຜະຍາດອອກຈາກຝູງ, ທຳຄວາມສະອາດຮາງອາຫານ, ບໍລິເວນຄອກ ແລະ ຝື້ນຄອກ.
 - ກວດວິໄຈຫາຜະຍາດໂດຍສັງເກດເບິ່ງອາການວ່າ ແບ້ຈະເບື້ອອາຫານ, ຈ່ອຍຜອມລົງຢ່າງໄວວາ, ເຫງົາ, ຂົນຫຍິ້ງ, ຖອກທ້ອງ, ບວມນ້ຳໃຕ້ຄາງ ແລະ ຝື້ນທ້ອງ ເຊິ່ງຄວນກວດທຸກໆປີ ຢ່າງໜ້ອຍປີລະ 1 ຄັ້ງ.



ກາຝາກພາຍນອກ

ອາການຂອງຜະຍາດກາຝາກພາຍນອກ ມີດັ່ງນີ້:

- ຜິວໜັງບໍ່ກ້ຽງ, ຂົນຫຍິ້ງ, ຫຼື ຂັ້ນຮຸນແຮງແມ່ນຂົນຫຼົ່ນ (ບໍ່ມີຂົນໃນບາງບໍລິເວນ)
- ເກີດບາດແຜຕາມຜິວໜັງ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ
- ເຢື່ອເມືອກຈິດຊືດໃນບໍລິເວນຕາ, ອື່ນໆ
- ແບ້ນ້ຳໜັກຫຼຸດ, ຈ່ອຍຜອມ, ອ່ອນເພຍເກີດ ແລະ ເຈັບປ່ວຍໄດ້ງ່າຍ.

ກາຝາກພາຍນອກສາມາດເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

- ເກີດຈາກເຊື້ອຜະຍາດຊະນິດຕ່າງໆ
 - ເກີດຈາກສະພາບແວດລ້ອມມີການປ່ຽນແປງ
 - ເກີດຈາກການຈັດການກັບສິ່ງແວດລ້ອມບໍ່ເໝາະສົມ
 - ຄວາມເປີເປື້ອນ ແລະ ສຶກກະປົກໃນບ່ອນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງແບ້
- ການປ້ອງກັນແບ້ບໍ່ໃຫ້ມີກາຝາກພາຍນອກ
- ປະຕິບັດການສຸຂະອະນາໄມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ
 - ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ສະອາດ



- ມີການວາງແຜນຈັດການກັບສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເໝາະສົມ
- ຮັກສາຄວາມສະອາດບໍລິເວນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດ
- ແຍກສັດທີ່ຝືບເຫັນມີພະຍາດອອກຈາກຝູງ
- ໃຊ້ຢາຂ້າແມ່ກາຝາກພາຍນອກຊະນິດຕ່າງໆ

ຂໍ້ແນະນຳການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມກາຝາກໃນແບ້

1. ຂ້າແມ່ທ້ອງ (ກາຝາກ) ເປັນປະຈຳຕາມຫຼັກການທີ່ກຳນົດໄວ້, ໃນທຸກໆ 4-6 ອາທິດ. ຢາທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຂ້າແມ່ທ້ອງປະກອບດ້ວຍ:
 - a. ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໂຕກົມ ເຊັ່ນ: ອັນເບັນດາໂຊນ, ໄທອາເບັນດາໂຊນ, ໄຟແຣນເທນ, ເລວາມມິຊອນ,...
 - b. ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໂຕຕິດ ເຊັ່ນ: ນິໂຄຊາໄມ, ເມເບັນດາໂຊນ,...
 - c. ຢາຖ່າຍແມ່ພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ: ຣາຟອກຊາໄນ, ໄນໂຕໄຊນິດ,...
 - d. ຢາຂ້າເຊື້ອບິດ ເຊັ່ນ: ໂທທຼາຊູລິດ, ຊັນຟາຄະວິນອິກຊາລິນ,... ຫຼື ຖ້າແບ້ມີທັງແມ່ພະຍາດພາຍໃນ ແລະ ເຊື້ອບິດຮ່ວມກັນອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ຢາທັງ 3 ຊະນິດ ແລະ ຄວນຂ້າແມ່ທ້ອງທຸກໆ 4-6 ອາທິດ.
 - e. ສຳລັບ ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ ແມ່ນຄວນເລີ່ມຖ່າຍພະຍາດຄັ້ງທຳອິດເມື່ອອາຍຸ 8 ອາທິດ.
 - f. ທຳຄວາມສະອາດໂຮງເຮືອນແບ້ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ພື້ນໂຮງເຮືອນແບ້ຕ້ອງມີປ່ອງ ເພື່ອໃຫ້ຂີ້ແບ້ຕົກລົງໄປຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ລ້ອມໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແບ້ເຂົ້າໄປກ້ອງຄອກ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດຈາກຂີ້ແບ້ໄດ້.
2. ຂີ້ແບ້ ແລະ ສິ່ງເປື້ອນອື່ນໆຈາກແບ້ທີ່ມີພະຍາດຕ້ອງຝັງ ຫຼື ເຜົາ ທຳລາຍຖິ້ມໃຫ້ໝົດ.
3. ນຳໃຊ້ລະບົບແປງປຸກຫຍ້າ (ຜິດອາຫານສັດ) ໝູນວຽນ ໂດຍແປງແປງຫຍ້າອອກເປັນແປງຍ່ອຍ ແລະ ແຕ່ລະແປງຕ້ອງອ້ອມຮົ່ວກັນໄວ້ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ແບ້ໄປກິນຫຍ້າແຕ່ລະແປງຍ່ອຍໃນໄລຍະ 2 ອາທິດ.
 - a. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ນຳເອົາແບ້ໄປລ້ຽງໃນແປງອື່ນໆຕໍ່ໄປ ໂດຍຕ້ອງຈັດການແປງຫຍ້າທີ່ແບ້ໄປກິນແລ້ວ ໂດຍການຕັດຫຍ້າໃຫ້ສັ້ນລົງທີ່ສຸດ ຫຼື ໃຫ້ແສງແດດສອງເຖິງພື້ນດິນ ເພື່ອໃຫ້ໄຂ່ ແລະ ຕົວອ່ອນຂອງແມ່ພະຍາດຕາຍ ແລະ ຫຍ້າຈະເລີນເຕີບໂຕໆອກງາມໄວ ເພື່ອສາມາດນຳເອົາມາກິນຫຍ້າໃນແປງນັ້ນອີກໄດ້ໄວຂຶ້ນ,
 - b. ຄວນມີການໝູນວຽນພື້ນທີ່ຕະຫຼອດ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດສຳລັບປ່ອຍແບ້ ຄວນນຳໃຊ້ການຜຸກລ່າມແບ້ ແຕ່ບໍ່ຄວນຜຸກໄວ້ປ່ອນເກົ່າ.
4. ທຳລາຍຕົວນຳເຊື້ອຂອງແມ່ພະຍາດ ເຊັ່ນ: ໄຮ ແລະ ຫອຍນ້ຳຈືດ
5. ບໍ່ຄວນປ່ອຍແບ້ໄປແປງຫຍ້າທີ່ມີຄວາມປຽກຊຸ່ມ ແລະ ພື້ນດິນປຽກ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ສາມາດຕິດເຊື້ອພະຍາດໄດ້ງ່າຍຈາກຕົວອ່ອນທີ່ອາໄສຢູ່ແປງຫຍ້າ (ທົ່ງຫຍ້າ) ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຄຳນຶງຢູ່ສະເພີກໍຄື:

“ແບ້ທີ່ກິນອາຫານດີ ແລະ ມີການຈັດການທີ່ຖືກຕ້ອງ ຈະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ”

➤ ຖ້າແບ້ມີອາການຄຽດ, ອ່ອນເພຍ, ໄດ້ຮັບອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ສະອາດຈະເຮັດໃຫ້ແບ້ເກີດພະຍາດໄວທີ່ສຸດ!

➤ ເມື່ອພົບເຫັນອາການຜິດປົກກະຕິຂອງແບ້ ໃຫ້ກວດເບິ່ງຄືນວ່າເກີດຈາກບັນຫາຂອງອາຫານບໍ່?, ຖ້າແບ້ເປັນພະຍາດຍ້ອນອາຫານທີ່ກິນ, ຜູ້ລ້ຽງຕ້ອງປ່ຽນອາຫານໃຫ້ແບ້ຢ່າງຮີບດ່ວນ

ໃນກໍລະນີແບ້ເກີດພະຍາດ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາສັດຕະວະແພດບ້ານ/ເມືອງ ເພື່ອມາຊ່ວຍປິ່ນປົວໂດຍດ່ວນ!

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:



ພິມທີ່: ໂຮງພິມດິບຸກ

ພິມຄັ້ງທີ: 1

ພິມເພື່ອ: ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ