



ເຄື່ອງມື
ການປຸກຈິດສໍານຶກ
ກ່ຽວກັບ
ຄົນພິການ

DISABILITY AWARENESS TOOLKIT

ເຄື່ອງມື ການປູກຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ຄົນພິການ

ສັງລວມຄໍາຖາມສິນທະນາ ແລະ
ຮູບພາບປະກອບ



1. ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມພິການ ແລະ ຮູບພາບປະກອບ

- ✓ ສໍາລັບທ່ານແລ້ວ ຄໍາວ່າ ຄວາມພິການ ໝາຍເຖິງຫຍັງ?
- ✓ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າໃນບ້ານ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ມີໃຜແດ່ ທີ່ພິການ?
- ✓ ຖ້າມີ, ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ພິການຫຍັງ ຕາມທີ່ທ່ານສັງເກດເຫັນ?
- ✓ ມີຄວາມພິການໃດແດ່ທີ່ທ່ານຮູ້ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກ່າວເຖິງ?





1. ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມພິການ ແລະ ຮູບພາບປະກອບ







2. ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ດີພ້ອມຮູບພາບປະກອບ

- ✓ ທັດສະນະຄະຕິອັນໃດທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນບ້ານຂອງທ່ານມີຕໍ່ ເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມພິການ?
- ✓ ເປັນຫຍັງຄົນໃນບ້ານທ່ານຈຶ່ງມີທັດສະນະຄະຕິແນວນັ້ນຕໍ່ກັບຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ?
- ✓ ທ່ານຄິດວ່າ ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອເຫຼົ່ານັ້ນ ມາຈາກໃສ?
- ✓ ພໍ່ແມ່ ປະຕິບັດຕໍ່ລູກທີ່ມີຄວາມພິການແນວໃດ?
- ✓ ຖ້າພໍ່ແມ່ບໍ່ໃຫ້ເດັກທີ່ມີຄວາມພິການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ມັນຈະມີຜົນກະທົບແນວໃດ?



2. ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ດີພ້ອມຮູບພາບປະກອບ



ການນໍາທາງ (ຈູງ) ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ມີຄວາມພິການເຫັນວ່າເປັນການສ້າງຄວາມດີຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ບາງຄັ້ງເດັກທີ່ມີພໍ່ແມ່ພິການ ກໍ່ຖືກປະຕິເສດໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງເຕັມຮູບແບບແກ້ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ


ຮູບປະກອບທັງ 4 ຮູບນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວັດທະນະທໍາຄວາມເຊື່ອ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິດ້ານລົບສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກທັງ ຊາຍ, ຍິງ ແລະ ເດັກ. ທ່ານສາມາດຍົກໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າຄວາມເຊື່ອເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນທຸກຍຸກ ທຸກສະໄໝ ແລະ ທຸກເພດໄວ.

3. ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄວາມເຊື່ອ ດ້ານບວກ ພ້ອມຮູບ

- ✓ ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄວາມເຊື່ອ ດ້ານບວກ ກັບຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ?
- ✓ ການບໍລິການໃດແດ່ທີ່ທ່ານຄິດວ່າສາມາດເອົາເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ມີຄວາມພິການເຂົ້າຮ່ວມໄດ້?
- ✓ ວຽກງານໃນສັງຄົມໃດແດ່ທີ່ເດັກທີ່ມີຄວາມພິການສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້?



3. ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄວາມເຊື່ອ ດ້ານບວກ ພ້ອມຮູບ




4. ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ ຄວາມຊໍານານ ແລະ ວິຊາອາຊີບ

ກິດຈະກຳໃດແດ່ທີ່ເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມພິການສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້, ກິດຈະກຳເຫຼົ່ານັ້ນອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບ:

- ✓ ກິດຈະກຳທາງສັງຄົມ (ເຂົ້າຮ່ວມການສະຫຼອງ ແລະ ບຸນຕ່າງໆ ທີ່ຈັດໂດຍຄອບຄົວ ຫຼື ບ້ານ)
- ✓ ກິດຈະກຳເສດຖະກິດ (ເຮັດວຽກເພື່ອຫາເງິນ)
- ✓ ກິດຈະກຳປົກຄອງ (ການຕັດສິນໃຈໃນຊຸມຊົນ)



4. ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ ຄວາມທ້າສະ ແລະ ວິຊາອາຊີບ



ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສຸມໃສ່ການສ້າງ
ລາຍຮັບດ້ວຍວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຂໍທານຍັງເປັນ
ວິທີໜຶ່ງໃນການສ້າງລາຍຮັບ. ຖ້າມີຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມກ່າວເຖິງການຂໍທານ, ໃຫ້ອະ
ທິບາຍວ່າ ນັ້ນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ດີ.

5. ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບເຄື່ອງຄໍ້າຊຸ ແລະ ຮູບພາບປະກອບ


- ✓ ທ່ານຮູ້ຈັກເຄື່ອງຄໍ້າຊຸທີ່ສາມາດຊ່ວຍຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ ທີ່ເປັນເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ອັນໃດແດ່ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດດໍາລົງຊີວິດໄດ້ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ?



5. ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບເຄື່ອງຄ້າຊຸ ແລະ ຮູບພາບປະກອບ



ວິທີການສະແດງຮູບພາບປະກອບ



ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ
IMPAIRMENTS

ຄົນຕາບອດ
PERSON WHO IS BLIND



ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຕາບອດ

BLINDNESS AND VISUAL IMPAIRMENT

ສາເຫດ

ຄົນຜູ້ໜຶ່ງສາມາດ ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ/ຕາບອດ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຕັ້ງແຕ່ຕອນເກີດ ຫຼື ພາຍຫຼັງການເກີດ, ເຊິ່ງສາມາດເກີດຈາກຫຼາກຫຼາຍສາເຫດ, ແຕ່ສາເຫດທີ່ມັກເກີດແມ່ນ:

- > ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການເບິ່ງເຫັນແມ່ນມັກເກີດຈາກ ໂພສະນາການທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ການຕິດເຊື້ອ
- > ຝີ ໃນຕາ (Trachoma) ເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈາກການແຜ່ເຊື້ອຂອງ ແມ່ພະຍາດ ໂດຍແມງວັນ ຫຼື ການສຳພັດ.
- > ໂລກຕາບອດແຖບແມ່ນ້ຳ (River Blindness) ແມ່ນການແຜ່ກະຈາຍຂອງ ແມ່ພະຍາດ ໂດຍແມງວັນດຳ
- > ພະຍາດໝາກແດງ (Measles)
- > ສະໜອງໄດ້ຮັບ ການເສຍຫາຍໃນໄລຍະກ່ອນ, ລະຫວ່າງ ຫຼື ຫຼັງການເກີດ
- > ການບາດເຈັບຢູ່ຕາເນື່ອງຈາກອຸບັດຕິເຫດ
- > ແກ່ນຕາຊຸ່ນ - ຕໍ່ກະຈົກ (Cataracts), ເຊິ່ງອາດມີມາແຕ່ກຳເນີດ ຫຼື ເນື່ອງມາຈາກນ້ຳ ຫຼື ອາຫານທີ່ປົນເປື້ອນ
- > ຕໍ່ຫີນ (Glaucoma)
- > ກຳມະພັນ
- > ສູງອາຍຸ

ອາການ

- > ຕາບອດແມ່ນອາການທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນສິ່ງໃດໄດ້. ບາງຄົນມີຄວາມບົກຜ່ອງ ດ້ານການເບິ່ງເຫັນ (ຕາບອດບາງສ່ວນ) ເຊິ່ງພວກເຂົາຈະເບິ່ງເຫັນສິ່ງຕ່າງໆຢ່າງຈຳກັດ ເຊັ່ນ: ເຫັນເປັນພາບມົວຫຼືບໍ່ສາມາດຈຳ ແນກຮູບຮ່າງຂອງ ວັດຖຸໄດ້.
- > ຄົນເຮົາ ສາມາດຕາບອດໝົດສອງຂ້າງ ຫຼື ຕາທັງສອງຂ້າງ ຫຼື ຂ້າງດຽວທີ່ບອດເປັນບາງສ່ວນ.

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ບາງສາເຫດກໍສາມາດປິ່ນປົວ ຫຼື ຜ່າຕັດໄດ້ ເຊັ່ນ: ການຜ່າຕັດແກ່ນ ຕາຊຸ່ນ-ຕໍ່ກະຈົກ (cataract)
- > ການໃສ່ແວ່ນສາຍຕາກໍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ມີບັນຫາດ້ານການເບິ່ງເຫັນ ສາມາດເຫັນຈະແຈ້ງຂຶ້ນໄດ້
- > ຄົນທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງສາຍຕາ ຄວນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດດຳລົງຊີວິດໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ, ເຊັ່ນ: ການຮຽນຢ່າງ ໂດຍໃຊ້ໄມ້ນຳທາງ.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ
IMPAIRMENTS

ຄົນຫູໜວກ
PERSON WHO IS DEAF



ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການໄດ້ຍິນ - ຫູໜວກ

DEAFNESS AND HEARING IMPAIRMENT

ສາເຫດ

ຄົນຜູ້ໜຶ່ງສາມາດຫູໜວກສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ຕອນເກີດ ຫຼື ພາຍຫຼັງການເກີດ, ເຊິ່ງສາມາດເກີດ ຈາກຫຼາກຫຼາຍສາເຫດ, ແຕ່ສາເຫດທີ່ມັກ ເກີດແມ່ນ:

- > ກຳມະພັນ
- > ການເກີດກ່ອນກຳນົດ
- > ການຂາດທາດໄອໂອດິນ ໃນລະຫວ່າງຖືພາ
- > ແມ່ມານນຳໃຊ້ ຢາ ຫຼື ຢາປົວພະຍາດໃນລະຫວ່າງຖືພາ
- > ຫູຕິດເຊື້ອ (ຫຼັງຈາກເກີດ)
- > ເຫຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ (ຫຼັງຈາກເກີດ)
- > ສູງອາຍຸ
- > ການຄວັດຫູດ້ວຍວັດຖຸທີ່ແຫຼມ-ມີຄົມ

ອາການ

- > ບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບສຽງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ຫຼື ສຽງເອິ້ນ
- > ງ່ຽງຫົວໄປທາງດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ ຫຼື ເອົາມືຄອບຫູໄວ້

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ຜູ້ຊ່ຽວຊານທົດສອບການໄດ້ຍິນ
- > ເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງອາດສາມາດຊ່ວຍໄດ້
- > ໃຊ້ພາສາມື ຫຼື ໃຊ້ນິ້ວມືສະກົດຄຳ ເພື່ອ ສື່ສານກັນ
- > ການກວດຫາສາເຫດຂອງໃນການບໍ່ໄດ້ຍິນ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ແມ່ນ ເປັນສິ່ງສຳຄັນ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຫາຫົນທາງການປິ່ນປົວທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສື່ສານໄດ້.

ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ

ມີເດັກນ້ອຍຈຳນວນຫຼາຍທີ່ມີບັນຫາດ້ານການໄດ້ຍິນ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບ ການທົດສອບມາກ່ອນ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ ມັກຖືກເຂົ້າໃຈຜິດວ່າມີ ຄວາມບົກຜ່ອງທາງການຮຽນຮູ້. ດັ່ງນັ້ນເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງ ໃນການຮຽນຮູ້ຄວນໄດ້ຮັບການທົດສອບຄວາມສາມາດໃນການໄດ້ຍິນ ເພື່ອຫຼີກ ເວັ້ນບັນຫານີ້.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ
IMPAIRMENTS

ຄົນຫຼັງໂກ່ງ
/ຫຼັງຂ້ອມ
PERSON WITH A HUNCHBACK



ຫຼັງໂກ່ງ/ຫຼັງຂ້ອມ

HUNCHBACK

ສາເຫດ

- > ຫຼັງໂກ່ງ/ຫຼັງຂ້ອມ (Kyphosis) (ຫຼັງທີ່ເລີ່ມໂກ່ງ-ຂ້ອມລົງ) ພົບໄດ້ໃນເດັກນ້ອຍ ຫຼື ໄວໜຸ່ມ ເນື່ອງຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກະດູກສັນຫຼັງ ຫຼື ການບົບອັດກະດູກສັນຫຼັງ ຜ່ານໄລຍະເວລາດົນນານ.
- > ອາດເປັນຜົນຈາກ ກ້າມຊີ້ນຂອງຫຼັງອ່ອນແອ ຫຼື ຈາກທ່າທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ມັກເກີດໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມ
- > ຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນເວລາເກີດ - ຖ້າກະດູກສັນຫຼັງຂອງເດັກນ້ອຍ ບໍ່ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນຄັນຂອງແມ່.
- > ກະດູກຜ່ອຍ (Osteoporosis) - ອາການຫຼ້ຍຫ້ຽນ ຫຼື ບາງລົງຂອງກະດູກ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ອນກະດູກສັນ ຫຼັງແຕກ.

ອາການ

- > ການໂຄ້ງຂອງຫຼັງຫຼາຍເກີນໄປ
- > ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດ: ການເຈັບແອວ, ເຄັ່ງ/ຂໍ້ຕິດ, ສູນເສຍ ຄວາມສູງ, ລຳບາກໃນການຍືນໃຫ້ຊີ້, ແລະ ຄວາມອ່ອນເພຍ.

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ເດັກນ້ອຍອາດຕ້ອງການການຜ່າຕັດ ເພື່ອ ປັບແລວຂອງກະດູກສັນຫຼັງ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມຜິດປົກກະຕິບໍ່ໃຫ້ພັດທະນາເພີ່ມຂຶ້ນໄປອີກ.
- > ສາມາດອອກກຳລັງກາຍສະເພາະທ່າໃດໜຶ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍ ຊຸກຍູ້ການຢຽດຊື່ຂອງຫຼັງ
- > ນອກນັ້ນ ເດັກນ້ອຍກໍຄວນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັ່ງ ແລະ ຍືນໃຫ້ຊື່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ພ້ອມທັງ ພະຍາຍາມຢຽດບ່າດ້ານຫຼັງໃຫ້ຊື່ພ້ອມ ເພື່ອ ຊ່ວຍຮັກສາແລວຂອງກະດູກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິຂຶ້ນ.
- > ໃນບາງກໍລະນີ ກໍອາດຮັກສາດ້ວຍການໃຊ້ ເຄື່ອງຄ້າ-ສາຍ ຮັດ ແລະ ການເຮັດກາຍະພາບບຳບັດ.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ

IMPAIRMENTS

ເສຍອົງຄະ
ສ່ວນແຂນ ທີ່ ມີ

PERSON WITH AN AMPUTATED ARM



ການເສຍອົງຄະ - ສ່ວນແຂນ ຫຼື ມື

ARM OR HAND AMPUTATION

ສາເຫດ

ມັນມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ທີ່ເດັກນ້ອຍຈະເກີດມາ ໂດຍບໍ່ມີແຂນ/ມື ຂ້າງໃດຂ້າງໜຶ່ງ ຫຼື ທັງສອງຂ້າງ. ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ, ເດັກນ້ອຍ ຈະສູນເສຍແຂນ ເນື່ອງຈາກອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ສິງຄາມ. ໃນກໍລະນີອື່ນໆ, ແຂນ-ຂາ ອາດຈຳເປັນຕ້ອງຕັດຖ້າຫາກ ກະດູກມີການຕິດເຊື້ອ ຫຼື ມີເນື້ອງອກ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ອາການ

- > ສູນເສຍບາງພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ, ອາດສູນເສຍມື ຂ້າງໜຶ່ງ/ ມືທັງສອງຂ້າງ ຫຼື ແຂນຂ້າງໜຶ່ງ/ທັງສອງຂ້າງ
- > ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດສະເພາະພຽງແຕ່ ຂາ, ແຂນ ຫຼື ນິ້ວ, ແຕ່ຍັງສາມາດ ເສຍຫູ, ດັງ, ລິ້ນ, ເອິກ ແລະ ອະໄວຍະວະເພດ.

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ ຕ້ອງຮັກສາ ສ່ວນປາຍຂອງ ອະໄວຍະວະ ທີ່ຖືກຕັດ ເພື່ອຮັກສາຮູບຊົງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບການໃສ່ ແຂນ-ຂາທຽມ (ອົງຄະທຽມ).
- > ສຳລັບ ມື ຫຼື ແຂນ ທີ່ຖືກຕັດຄວນນຳໃຊ້ ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃນການ ຈັບ-ຖື ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ດັດປັບ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການກິດຈະກຳ ປະຈຳວັນ.
- > ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ກ້າມຊີ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຂີ້ຕໍ່ຊີ້ ແລະ ກຽມເນື້ອເຫຍື່ອທີ່ເປັນຮອຍ ໃຫ້ແຫ້ງດີ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແບກຮັບນ້ຳໜັກຂອງ ອົງຄະທຽມໄດ້.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ

IMPAIRMENTS

ຄົນເສຍອົງຄະ
ສ່ວນຂາ ຫຼື ຕີນ

PERSON WITH AN AMPUTATED LEG



ການເສຍອົງຄະ - ສ່ວນຂາ ຫຼື ຕີນ

LEG OR FOOT AMPUTATION

ສາເຫດ

ມັນມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ເດັກນ້ອຍຈະເກີດມາ ໂດຍບໍ່ມີຂາຂ້າງໃດ ຂ້າງໜຶ່ງ ຫຼື ທັງສອງຂ້າງ. ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ, ເດັກນ້ອຍຈະສູນເສຍ ແຂນ ເນື່ອງຈາກອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສົງຄາມ. ໃນກໍລະນີອື່ນໆ, ແຂນ-ຂາ ອາດຈຳເປັນຕ້ອງຕັດອອກ ຖ້າຫາກກະດູກ ມີການຕິດເຊື້ອ ຫຼື ມີ ເນື້ອງອກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ

ອາການ

- > ສູນເສຍບາງພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ, ອາດສູນເສຍຂາຂ້າງໜຶ່ງ/ ຂາທັງສອງຂ້າງ ແຕ່ຫົວເຂົ້າລົງມາ, ຫຼື ຂາຂ້າງ ໜຶ່ງ/ຂາ ທັງສອງ ຂ້າງ ເໜືອຫົວເຂົ້າ.
- > ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດສະເພາະພຽງແຕ່ ຂາ, ຕີນ ຫຼື ນິ້ວຕີນ,ແຕ່ຍັງສາມາດ ເສຍຫູ, ດັງ, ລິ້ນ, ເອິກ ແລະ ອະໄວຍະວະເພດ.

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ ຕ້ອງຮັກສາປາຍ ຂອງ ອະໄວຍະວະ ສ່ວນທີ່ຖືກຕັດ ເພື່ອຮັກສາຮູບຮ່າງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບການໃສ່ ແຂນ-ຂາທຽມ/ ອົງຄະທຽມ.
- > ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ກ້າມຊີ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຂີ້ຕໍ່ຊີ້ ແລະ ກຽມເນື້ອເຫຍື່ອທີ່ເປັນຮອຍ ໃຫ້ແຫ້ງດີ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແບກຮັບນ້ຳໜັກຂອງ ອົງຄະທຽມໄດ້.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ
IMPAIRMENTS

ຜູ້ປ່ວຍໂປລິໂອ
PERSON WITH POLIO



ພະຍາດໂປລິໂອ

POLIO

ສາເຫດ

- > ພະຍາດໂປລິໂອ ແມ່ນໄວຣັດທີ່ສາມາດທຳລາຍເສັ້ນປະສາດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ແຂນ, ລຳໂຕ, ແລະ/ຫຼື ຂາ (ມັນບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ຄວາມສາມາດທາງຈິດໃຈ).

ອາການ

- > ຄົນເຈັບສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຕິດເຊື້ອນີ້ ສາມາດເຊົາຈາກພະຍາດນີ້ ໂດຍບໍ່ທັນສັງເກດເຫັນຜົນກະທົບຕ່າງໆເລີຍ
- > ຄົນເຈັບບາງຄົນ ອາດມີອາການຖອກທ້ອງ, ອິດເມື່ອຍ, ເປັນໄຂ້ ຫຼື ເປັນໄອເລັກໜ້ອຍ
- > ມີພຽງຄົນເຈັບຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ເປັນອຳມະພາດ, ເຊິ່ງໃນບາງກໍລະນີກໍ່ຫາຍຂາດທັງໝົດ ຫຼື ຫາຍຂາດພຽງແຕ່ບາງສ່ວນ

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ບໍ່ມີການຮັກສາ ສຳລັບ ພະຍາດໂປລິໂອ. ຄົນເຈັບພະຍາດໂປລິໂອສ່ວນໃຫຍ່ ສາມາດຫາຍຂາດ ດ້ວຍການພັກຜ່ອນ ແລະ ກິນອາຫານທີ່ມີໂພສະນາການທີ່ດີ.
- > ການຢຶດ/ຢຽດຮ່າງກາຍ ໃນຂະນະທີ່ນອນພັກຮັກສາຕົວ ຢູ່ເທິງຕຽງ ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນ ອາການກ້າມຊີ້ນຫົດໂຕ (ການຫົດຕົວສິ້ນລົງຂອງກ້າມຊີ້ນ)

ການປ້ອງກັນ

- > ຊັກຢາວັກຊີນໃນຕອນອາຍຸຍັງນ້ອຍໆ
- > ມີສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ
IMPAIRMENTS

ຜູ້ພິການ
ທາງສະໝອງ
PERSON WITH CEREBRAL PALSY



ສະໜອງພິການ

CEREBRAL PALSY

ສາເຫດ

- > ເນື່ອງຈາກສະໜອງເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນກ່ອນໜ້າ, ລະຫວ່າງ ຫຼື ຫຼັງຈາກ ການເກີດ

ອາການ

- > ສະໜອງພິການ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ທຸກບາດກ້າວຂອງ ພັດທະນາການ ທັງໝົດຂອງເດັກນ້ອຍ, ທັງໃນດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ.
- > ອາການກ້າມຊີ້ນຫົດເກັງ ແມ່ນລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງ ການພິການສະໜອງ. ອາການກ້າມຊີ້ນຫົດເກັງ ມັກເຮັດໃຫ້ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍມີອາການ ເຄັ່ງ-ຈ່ອງ ແລະ ການຢຶດ-ຄິງ. ມັນເປັນຜົນມາຈາກຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງ ຮ່າງກາຍ ແລະ ປະຕິກິລິຍາ ຕອບສະໜອງໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ພະຍາມ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໂຕເອງລົ້ມ.

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ສະໜອງພິການບໍ່ສາມາດຊ້ອມແຊມ ຫຼື ຮັກສາໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້, ແຕ່ການຫຼິ້ນ ແລະ ການກະຕຸ້ນ ໂດຍພໍ່ແມ່ຂອງເດັກ ແລະ ຜູ້ດູແລ ສາມາດພັດທະນາການເຮັດກິດຈະກຳປະຈຳວັນຂອງເດັກໃຫ້ດີ ຂຶ້ນໄດ້.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ
IMPAIRMENTS

ຜູ້ປ່ວຍ
ພະຍາດຫຼວງ
PERSON WITH LEPROSY



ພະຍາດຫຼວງ

LEPROSY

ສາເຫດ

- > ພະຍາດຫຼວງ (ຂີ້ທູດ) ແມ່ນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອຈາກແບດທິເລຍ ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ເສັ້ນປະສາດໃນຜິວໜັງ, ໜ້າ, ມື ແລະ ຕີນ.
- > ພະຍາດຫຼວງ ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ຫຼື ສາມາດແຜ່ເຊື້ອຜ່ານລະອອງ (ຂອງແຫຼວຂອງຮ່າງກາຍໃນອາກາດ)

ອາການ

- > ຫຼັງຈາກທີ່ຕິດເຊື້ອແລ້ວ, ມັນອາດໃຊ້ເວລາເປັນ ເດືອນ ຫຼື ປີ ກວ່າທີ່ພະຍາດຫຼວງຈະແດງສັນຍານທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າໄດ້.
- > ຮ້ອຍຈໍ້າ-ດ່າງສີຂາວເທິງຜິວໜັງ, ຂາດຄວາມຮູ້ສຶກ; ຕີນ & ມືອ່ອນແອ; ອາການບວມ/ແຜເປື້ອຍເທິງໃບໜ້າ.
- > ອາການສູນເສຍຄວາມຮູ້ສຶກຕາມບໍລິເວນ ມື ແລະ ຕີນ ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດ ບາດແຜ ແລະ ແຜເປື້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຮັດກິດຈະກຳປະຈຳວັນໄດ້ - ເວລາມີແຜໄຫມ້ເກີດ ຂຶ້ນກໍບໍ່ຮູ້ສຶກ ແລະ ເວລາໃສ່ເກີບທີ່ມີກ້ອນຫີນຢູ່ໃນກໍບໍ່ຮູ້ໂຕວ່າມີກ້ອນຫີນຢູ່.

- > ບາດແຜ ແລະ ແຜເປື້ອຍ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການຕິດເຊື້ອ, ການທຳລາຍຜິວໜັງ, ມື, ແລະ ຕີນຢ່າງຖາວອນ, ແລະ ຖ້າຫາກບໍ່ຮັກສາໃຫ້ດີກໍອາດຕ້ອງໄດ້ຕັດອອກ
- > ເສັ້ນປະສາດທີ່ຖືກທຳລາຍ ສາມາດນຳໄປສູ່ການສູນເສຍ ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງກ້າມຊີ້ນ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິ.

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ຖ້າກວດພົບການພະຍາດໃນຕອນຕົ້ນ ແລະ ຮັກສາດ້ວຍຢາສຸດຜະສົມໃນໄລຍະຍາວ (Multi-Drug Therapy (MDT) ກໍ່ ສາມາດຢຸດການພັດທະນາຂອງເຊື້ອພະຍາດໄດ້.
- > ບາດແຜ ຕ້ອງການການພັກ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕິດເຊື້ອ.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ

IMPAIRMENTS

ຜູ້ທີ່ມີ

ຄວາມຜິດປົກກະຕິ
ທາງແອກກະດູກສັນຫຼັງ

PERSON WITH SPINA BIFIDA



ແອກກະດູກສັນຫຼັງມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ

SPINA BIFIDA

ສາເຫດ

- > ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ ເກີດຈາກບັນຫາ ໃນການພັດທະນາໃນໄລຍະທຳອິດ ທີ່ເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນຄັນຂອງແມ່.
- > ກະດູກສັນຫຼັງ ທີ່ຊ່ວຍປົກປ້ອງໄຂສັນຫຼັງນັ້ນ ບໍ່ກໍ່ຕົວ-ຮວມກັນ ແລະ ບໍ່ປິດແຈບຕິຕາມທີ່ມັນຄວນເປັນ.

ອາການ

- > ອາການ ເຊິ່ງສິ່ງຜົນຕໍ່ ກະດູກສັນຫຼັງ ແລະ ປົກກະຕິແລ້ວ ມັກຈະເຫັນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຕອນເກີດ. ບາງຄັ້ງໃນຕອນເກີດ, ກໍອາດມີບາດແຜເປີດຢູ່ຫຼັງ ທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
 - ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພິການທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ຕັ້ງແຕ່ລະດັບເບົາ ຈົນຮອດລະດັບຮຸນແຮງ.
 - ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດມີບັນຫາ ເຊັ່ນ: ການສູນເສຍ ຄວາມຮູ້ສຶກໃນບໍລິເວນ ຂາ ຫຼື ຕີນ, ການບໍ່ສາມາດ ເຄື່ອນຍ້າຍຂາໄດ້ ແລະ/ຫຼື ບໍ່ສາມາດອົດກັນຍ່ຽວໄດ້.

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ການເຮັດກິດຈະກຳທີ່ມີ ການເຄື່ອນໄຫວ-ອອກແຮງ ຂອງ ຮ່າງກາຍ ຢ່າງເປັນປະຈຳແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ, ໂດຍສະເພາະ ສຳລັບຜູ້ທີ່ການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ເຊັ່ນ: ກະດູກ ສັນຫຼັງເປີດ.
- > ການນຳໃຊ້ ລໍ້ເລື່ອນ, ໄມ້ຄໍ້າ, ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ ຫຼື ເຄື່ອງຊ່ວຍຢ່າງ ຈະຊ່ວຍຜູ້ທີ່ມີບັນຫາໄຂສັນຫຼັງເສຍຫາຍຂັ້ນຮຸນແຮງ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວ ໃຫ້ສາມາດໄປມາໄດ້ຢ່າງສະດວກ.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ
IMPAIRMENTS

ຄົນໂຕເຕ້ຍ - ແຈ
PERSON WITH DWARFISM



ສະພາວະທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ເຕີບໂຕຕາມປົກກະຕິ (ໂຕເຕ້ຍ - ແຈ້)

DWARFISM

ສາເຫດ

- > 1 ໃນ 5 ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີສະພາວະຮ່າງກາຍບໍ່ເຕີບໂຕຕາມປົກກະຕິ (ເຕ້ຍ-ແຈ້) ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກກຳມະພັນ. ນີ້ແມ່ນຜົນມາຈາກການຜ່າເຫຼົ້າທາງພັນທຸກຳ-ຢືນແບບສຸ່ມ ທັງໃນອະສຸຈິ ຂອງພໍ່ ຫຼື ໄຂ່ຂອງແມ່.
- > ສາເຫດອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ສະພາວະຂອງຮ່າງກາຍບໍ່ເຕີບໂຕຕາມປົກກະຕິ (ໂຕເຕ້ຍ - ແຈ້) ລວມມີ: ການເຜົາຜານອາຫານ (ການຖ່າຍທອດທາງພັນທຸກຳທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາ ກ່ຽວກັບປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງທາງເຄມີໃນຮ່າງກາຍ) ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຂອງໂຮໂມນເຊັ່ນ: ຂາດໂຮໂມນໃນການ ຈະເລີນເຕີບໂຕ (growth hormones) ຫຼື ໂພສະນາການທີ່ບໍ່ດີ.

ອາການ

- > ສິ່ງຜິດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ ສູງ 4'10 ຟຸດ (147.32 ຊມ) ຫຼື ເຕ້ຍກວ່ານັ້ນ. ຄວາມສູງໂດຍສະເລ່ຍຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີສະພາວະຮ່າງກາຍເຕ້ຍ-ແຈ້ ແມ່ນ 4'0 ຟຸດ (121.92 ຊມ), ແຕ່ຄວາມສູງທົ່ວໄປ ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 2'8 ຟຸດ(81.28 ຊມ) ຫາ 4'8 ຟຸດ(142.24ຊມ)
- > ແຂນ ແລະ ຂາສັ້ນ ເມື່ອທຽບກັບລຳໂຕ, ແລະ ຫົວມີຂະໜາດໃຫຍ່ ບໍ່ສົມສ່ວນ, ໜ້າຜາກໂປ-ປຸດ, ແລະ ດັງແມບ.

- > ເດັກນ້ອຍມັກມີສັນຫຼັງໂຄ້ງເອ່ນ, ຫ້ອງປຸ້ງ -ໂຊ່ນ ແລະ ຂາໂຂງ

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ຄົນທີ່ມີສະພາວະທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ເຕີບໂຕຕາມປົກກະຕິ (ໂຕເຕ້ຍ - ແຈ້) ສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານສະຕິປັນຍາ, ມີອາຍຸຢືນຕາມປົກກະຕິ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີພໍສົມຄວນ.
- > ຄົນທີ່ມີສະພາວະທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ເຕີບໂຕຕາມປົກກະຕິ (ໂຕເຕ້ຍ - ແຈ້) ບາງຄົນ ອາດຕ້ອງການຜ່າຕັດ ຫຼື ການປິ່ນປົວທາງການແພດອື່ນໆ ເພື່ອແກ້ໄຂອາການແຊກຊ້ອນ ແລະ ເພີ່ມການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ໝາຍເຫດ

ການນຳໃຊ້ຄຳວ່າ "ເຕ້ຍ - ແຈ້" ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຂຶ້ນກັບບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຄຳນີ້ ອາດຖືເປັນຄຳທີ່ຮຸນແຮງ - ບໍ່ໃຫ້ກຽດ. ດັ່ງນັ້ນ ຄຳສັບ ເຊັ່ນ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍຖືກຈຳກັດ , ສັດສ່ວນຂອງຮ່າງ ກາຍສັ້ນ, ຄົນໂຕນ້ອຍ ແມ່ນ ບັນດາຄຳສັບ ທີ່ມັກໃຊ້ແທນ. ວິທີ ການທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການເອີ້ນຊື່ຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນໂດຍກົງ!

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ
IMPAIRMENTS

ຜູ້ທີ່ມີ
ຫົວຂະໜາດ
ໃຫຍ່ກວ່າປົກກະຕິ
PERSON WITH MACROCEPHALY



ຫົວທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າປົກກະຕິ

MACROCEPHALY

ສາເຫດ

ສາເຫດທີ່ມັກພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ ສໍາລັບ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຂະໜາດ ຫົວໃຫຍ່ ກວ່າປົກກະຕິແມ່ນ:

- > ສະໜອງທີ່ຂະຫຍາຍໃຫຍ່
- > ຫຼືນໍ້າໃນສະໜອງຫຼາຍເກີນໄປ ເຊິ່ງນໍ້າເຫຼົ່າທີ່ຖືກເກັບກັກໃນ ພາກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສະໜອງຮຽກວ່າ: ໂພງສະໜອງ. ກໍລະນີ ນີ້ອາດເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດ ລວມມີ: ກ້ອນຊິດ (cysts) ທີ່ຜິດປົກຕິພາຍໃນສະໜອງ, ການຕິດ ເຊື້ອເຊັ່ນ : ເຫຍື້ອຫຸ້ມສະໜອງອັກເສບ.

ອາການ

- > ອາການທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ: ການມີຂະໜາດຫົວ ທີ່ໃຫຍ່
- > ອາການອື່ນໆສາມາດລວມເຖິງ:
 - ຄວາມຊັກຊ້າ ໃນການບັນລຸພັດທະນາການຢູ່ຈຸດສູງສຸດ
 - ເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງສ່ວນອື່ນໆຂອງ
 - ຮ່າງກາຍຊັກຊ້າ
 - ອາການຊັກ

ການສະໜັບສະໜູນ

ບໍ່ມີການປິ່ນປົວອັນສະເພາະ ສໍາລັບ ຄົນທີ່ມີຫົວຂະໜາດໃຫຍ່ ກວ່າປົກກະຕິ (macrocephaly). ການປິ່ນປົວທາງການແພດ ສໍາລັບ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຫົວໃຫຍ່ກວ່າປົກກະຕິແມ່ນ ເນັ້ນໜັກໃສ່ການ ຮັກສາອາການສະເພາະ ເຊັ່ນ: ພັດທະນາການທີ່ຊັກຊ້າ ແລະ ການປິ່ນ ປົວຈາກການປົ່ງມັດຕິຂອງ ອາການຂັ້ນຕົ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກມີຫົວໃຫຍ່ ກວ່າປົກກະຕິ.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ

IMPAIRMENTS

ຜູ້ທີ່ມີ

ຫົວຂະໜາດ
ນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ

PERSON WITH MICROCEPHALY



ຄົນທີ່ມີຂະໜາດຫົວນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ

MICROCEPHALY

ສາເຫດ

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຂະໜາດຫົວນ້ອຍກວ່າ ປົກກະຕິ (microcephaly) ແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້ສາເຫດລະອຽດຄັກແນ່ນ.

ບາງສາເຫດທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແມ່ນ:

- > ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກຳມະພັນ
- > ບັນຫາໃນລະຫວ່າງການຖືພາ ເຊັ່ນ: ການຕິດເຊື້ອ, ການຂາດສານອາຫານ, ການດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ການໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ການສະໜອງເລືອດໄປຍັງສະໜອງຂອງ ເດັກນ້ອຍຖືກລົບກວນ.
- > ມີການແຜ່ເຊື້ອຂອງ ໄວຣັດ ຊິກາ (Zika) ໄປຍັງແມ່ມານທີ່ຖືພາ ໂດຍຍຸງທີ່ຕິດເຊື້ອ. ເຊື້ອໄວຣັດນີ້ ຈະສົ່ງຕໍ່ຈາກຜູ້ເປັນແມ່ໄປຍັງເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນຄັນຂອງລາວໃນລະຫວ່າງການຖືພາ, ເຊິ່ງ ໄວຣັດນີ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຫົວຂອງເດັກນ້ອຍມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ (microcephaly)

ອາການ

- > ອາການຫົວນ້ອຍຜິດປົກກະຕິ (microcephaly) ແມ່ນຄວາມບົກຜ່ອງໃນເວລາເກີດ ເຊິ່ງ ຫົວຂອງເດັກຈະມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າທີ່ຄາດການໄວ້ ເມື່ອປຽບທຽບກັບ ເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນໆ ທີ່ມີເພດ ແລະ ອາຍຸເທົ່າກັນ.

- > ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຂະໜາດຫົວນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ ມັກມີຂະໜາດສະໜອງທີ່ນ້ອຍກວ່ານຳ, ເຊິ່ງສະໜອງອາດບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງເໝາະສົມ.

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ຫົວນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ (Microcephaly) ແມ່ນສະພາບທີ່ຕິດໂຕຕະຫຼອດຊີວິດ. ບໍ່ມີການປິ່ນປົວທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ຫຼື ການຮັກສາທີ່ເປັນມາດຕະຖານ.
- > ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງພວກເຂົາ, ການກະຕຸ້ນແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພັດທະນາການເວົ້າ, ການເຮັດກິດຈະກຳປະຈຳວັນ ແລະ ການມີສຸຂະພາບທີ່ດີ.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ
IMPAIRMENTS

ຜູ້ທີ່ມີອາການ
ດາວຊິນໂດຣມ
PERSON WITH DOWN SYNDROME



ກຸ່ມອາການດາວຊິນໂດຣມ

DOWN SYNDROME

ສາເຫດ

ດາວຊິນໂດຣມ (Down syndrome) ເກີດມາຈາກການມີໂຄໂມໂຊມທີ່ເກີນມາ, ເຮັດໃຫ້ມີໂຄໂມໂຊມຄູ່ທີ 21 ໃນຈຸລັງຂອງເດັກນ້ອຍ. ໃນກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່, ມັນບໍ່ແມ່ນການຖ່າຍທອດຂອງກຳມະພັນ ແຕ່ເປັນຍ້ອນຄວາມຜິດພາດທາງພັນທຸກຳ-ຢີນໃນອະສຸຈິ ຫຼື ໄຂ່. ຄວາມສ່ຽງໃນການມີລູກທີ່ມີອາການດາວຊິນໂດຣມ (Down syndrome) ຈະສູງຂຶ້ນຕາມອາຍຸຂອງຜູ້ເປັນແມ່.

ອາການ

- > ເດັກນ້ອຍທີ່ມີກຸ່ມອາການດາວຊິນໂດຣມ (Down syndrome) ມັກມີລັກສະນະທາງກາຍະພາບແບບສະເພາະເຊັ່ນ: ດັງນ້ອຍ ແລະ ສັນຂອງດັງແມບ, ລິ້ນມັກເດ່-ຢືນອອກມາ, ຄໍສິ້ນ, ມີໜັງສ່ວນເກີນທີ່ດ້ານຫຼັງ, ຫູນ້ອຍ.
- > ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາການດາວຊິນໂດຣມ (Down syndrome) ມັກມີພັດທະນາການທາງດ້ານຮ່າງກາຍຊ້າ ກວ່າ ພັດທະນາການຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີອາການດາວຊິນໂດຣມ.

- > ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ, ບັນຫາໃນການຄິດ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແມ່ນ ມັກເກີດກັບເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນ ດາວຊິນໂດຣມ ແລະ ບົກກະຕິແມ່ນມີຕັ້ງແຕ່ ລະດັບເບົາ ຈົນເຖິງ ລະດັບກາງ.

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ອາການດາວຊິນໂດຣມ (Down syndrome) ບໍ່ມີຢາຮັກສາ, ແຕ່ການກະຕຸ້ນ ສາມາດຊ່ວຍໃນການພັດທະນາຂອງເດັກນ້ອຍໄດ້.
- > ສ່ວນຫຼາຍ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາການດາວຊິນໂດຣມ (Down syndrome) ມັກມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການມີບັນຫາໃນການໃຊ້ຢາຫຼາຍກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຂໍແນະນຳໃຫ້ ນຳເດັກມາກວດສຸຂະພາບກັບທ່ານໝໍເປັນປະຈຳ
- > ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາການ ດາວຊິນໂດຣມ (Down syndrome) ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ຖ້າຫາກກິດຈະກຳທີ່ເຮັດນັ້ນໄດ້ຖືກປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ

IMPAIRMENTS

ຜູ້ທີ່ມີ

ຄວາມພິການ

ທາງການໄດ້ຍິນ-ການເບິ່ງເຫັນ

PERSON WHO IS DEAF-BLIND



ຄວາມພິການທາງການໄດ້ຍິນ-ການເບິ່ງເຫັນ

DEAF-BLIND

ສາເຫດ

- > ສາເຫດທີ່ມັກພົບຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ເມື່ອແມ່ມານຕິດເຊື້ອ ຣີບີລາ (Rubella) ໃນລະຫວ່າງກຳລັງຖືພາ ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທຳອິດ.
- > ຄວາມພິການທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ-ການເບິ່ງເຫັນສາມາດເປັນ ຄວາມພິການທາງການໄດ້ຍິນ-ເບິ່ງເຫັນທີ່ເກີດຕາມຫຼັງ (acquired deaf-blindness), ທີ່ຖືກພັດທະນາຈາກພາຍຫຼັງ ການເກີດ, ເນື່ອງຈາກ: ປະສົບອຸບັດຕິເຫດ ຫຼືຄວາມເຈັບປ່ວຍ (ມັກມີເຫຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ), ເງື່ອນໄຂ ທາງພັນທຸກຳ ຫຼື ສູງອາຍຸ

ອາການ

- > ອາດບໍ່ໄດ້ມີອາການ ຫຼື ຕາບອດ ທັງໝົດ, ແຕ່ ອາດຍັງ ສາມາດໄດ້ຍິນ ຫຼື ເບິ່ງເຫັນ ບາງສ່ວນ, ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນອາດ ເກືອບສູນເສຍປະສາດສຳພັດທັງສອງຢ່າງໄປ.
- > ມີບັນຫາກັບປະສາດສຳພັດຫຼັກທີ່ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາການ ສື່ສານ, ມີການປະຕິສຳພັນກັບຄົນ ອື່ນໆ ແລະ ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວ ກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ.

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ນຳໃຊ້ ຄວາມສາມາດໃນການຟັງ ແລະ/ຫຼື ການເບິ່ງເຫັນທີ່ຍັງມີ, ພ້ອມທັງ ນຳໃຊ້ ພາສາມື, ການໃຊ້ນິ້ວສະກົດຄຳ ແລະ/ຫຼື ການນຳໃຊ້ ພາສາເບວ (ໜັງສືນູນສຳລັບຄົນຕາບອດ) ເພື່ອສື່ສານກັນ.
- > ຖ້າຫາກສູນເສຍການໄດ້ຍິນ/ການເບິ່ງເຫັນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮຽນຕົວ ອັກສອນປົກກະຕິແລ້ວ, ການຂຽນຕົວອັກສອນ, ຕົວໜັງສື ຫຼື ຄຳສັບລົງໃສ່ຝາມື ກໍສາມາດໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການສື່ສານໄດ້.
- > ການນຳໃຊ້ ໄມ້ນຳທາງ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ມີຄວາມ ບົກຜ່ອງປະເພດນີ້ໃຫ້ສາມາດໄປມາເອງໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ພວກເຂົາມີອິດສະລະຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ

IMPAIRMENTS

ຜູ້ທີ່ເປັນ
ພະຍາດຄຣີທິນິສຊິມ

PERSON WITH CRETINISM



ພະຍາດຄຣິທິນິສຊິມ (CRETINISM) - ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໂຮໂມນທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ-ສະຕິປັນຍາມີການພັດທະນາຊ້າ

ສາເຫດ

- > ຄຣິທິນິສຊິມ (Cretinism) ແມ່ນສະພາບຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ສະຕິປັນຍາໄດ້ຖືກຢຸດສະງັດຢ່າງຮຸນແຮງ ເນື່ອງຈາກ ບໍ່ມີການຮັກສາ ຕ່ອມໄທຣອຍ (thyroid gland) ທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກ ໃນຕອນເກີດ.
- > ສາເຫດທີ່ມັກພົບໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນການຂາດທາດໄອໂອດິນໃນອາຫານທີ່ແມ່ກິນໃນລະຫວ່າງການຖືພາ.
- > ໃນຫຼາຍໆແຫ່ງໃນໂລກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂົງເຂດ ຫຼື ສະຖານທີ່ ເປັນພື້ນທີ່ຮາບສູງ ຫຼື ພູດອຍ ທີ່ມັກມີ ນໍ້າຖ້ວມ ເປັນປະຈຳ, ເຮັດໃຫ້ ເກືອໃນເຂດນີ້ມີທາດໄອໂອດິນຕໍ່າ ເຊິ່ງ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ສັດມີທາດໄອໂອດິນຕໍ່າ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້ ກໍມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ພະຍາດ ຄຣິທິນິສຊິມ (cretinism).

ອາການ

- > ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍຊ້າຊ້າ
- > ການຂະຫຍາຍຂອງ ຕ່ອມໄທຣອຍ (thyroid gland) ເກີດມີອາການ ບວມທີ່ເອີ້ນວ່າ: ຄໍເອີມ (goiter)

- > ບາງອາການຂອງ ພະຍາດ (cretinism) ແມ່ນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບ ກຸ່ມອາການ ດາວຊິນໂດຼມ (Down syndrome) ຕົວຢ່າງ: ມີການພັດທະນາທາງດ້ານຈິດໃຈ ສະຕິປັນຍາຊ້າ, ມີການຈະເລີນ ເຕີບໂຕຊ້າຫຼາຍ ແລະ ມີອາຍຸສັ້ນ, ມີຜົມປົ່ງຈົນຮອດບໍລິເວນໜ້າຜາກ, ເປືອກຕາບວມ, ດັງແມບ, ເນື້ອທີ່ລະຫວ່າງຕາສອງຂ້າງກວ້າງ ແລະ ມີ ໜ້າ, ແຂນ ແລະ ຂາບວມ.

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ການຮັກສາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ແລະ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດ້ວຍຢາປົວ ໄທລອຍ (thyroid) ສາມາດຊ່ວຍ ປັບປຸງການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ລັກສະນະ ທາງກາຍະພາບ, ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ປ້ອງກັນພັດທະນາ ການທາງດ້ານຈິດໃຈທີ່ຊ້າ.
- > ໃນເຂດທີ່ມັກພົບມີອາການຄໍເອີມ, ການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍ້າໃຊ້ ເກືອໄອໂອດິນ ໃນເວລາແຕ່ງກິນ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ ພະຍາດ ຄຣິທິນິສຊິມ (cretinism) - ຄວາມບໍ່ສົມປະກອບຂອງໂຮໂມນທີ່ເຮັດ ໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ-ສະຕິປັນຍາ ມີການພັດທະນາຊ້າ ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ
IMPAIRMENTS

ຜູ້ທີ່ມີ
ຫົວເຂົ້າຜິດຮູບ
PERSON WITH VALGUS KNEES



ການຜິດຮູບຂອງຫົວເຂົ້າ - ແບບຫົວເຂົ້າຫັນຈຸກັນ, ແຕ່ຂໍ້ຕົນ ເດ່ອອກດ້ານນອກ

VALGUS KNEES

ສາເຫດ

- > ບາງຄັ້ງແມ່ນເກີດຈາກ ຕໍາແໜ່ງການພັບຂອງຂາຂອງ ເດັກນ້ອຍ ໃນເວລາທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງຂອງແມ່
- > ສາມາດພັດທະນາໄດ້ ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກບັນຫາທາງການແພດ ຫຼື ພະຍາດ ເຊັ່ນ:
 - ການບາດເຈັບຂອງ ກະດູກສັນຫຼັງ (ມີແຕ່ຂາຂ້າງດຽວ ທີ່ມີການຜິດຮູບຂອງຫົວເຂົ້າ-ແບບຫົວເຂົ້າຈຸກັນ, ແຕ່ຂໍ້ຕົນເດ່ອອກດ້ານນອກ (knock-kneed)
 - ກະດູກອັກເສບ (ເປັນໜອງ)
 - ນໍ້າໜັກເກີນ ຫຼື ເປັນພະຍາດຕຸ້ຍ
 - ພະຍາດກະດູກອ່ອນ (ພະຍາດທີ່ ເກີດຈາກການຂາດ ວິຕາມິນດີ)

ອາການ

- > ຫົວເຂົ້າຈຸກັນ, ແຕ່ຂໍ້ຕົນບໍ່ຈອດກັນ ເຮັດໃຫ້ຂາຫັນເຂົ້າ ດ້ານໃນ
- > ນີ້ແມ່ນອາການປົກກະຕິ ຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນລະຫວ່າງ ອາຍຸ 2 ປີ ເຖິງ 12 ປີ, ແຕ່ປົກກະຕິແລ້ວ ແຕ່ອາຍຸ 5 ຫຼື 6 ຫົວເຂົ້າຄວນເລີ່ມຢຽດຊື່ໄດ້ແລ້ວ.


- > ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຢ່າງ (ບໍ່ຄ່ອຍພົບ)
- > ຖ້າຫາກປ່ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ຮັກສາ, ອາການຫົວເຂົ້າໂກ່ງເຂົ້າກັນຜິດປົກກະຕິ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຂໍ້ອັກເສບໃນຕອນຕົ້ນ ແລະ/ຫຼື ພື້ນຕົນທີ່ພຽງກັບພື້ນ.

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ - ຫຼາຍຂາ ອາດສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ຫົວເຂົ້າຢຽດຊື່ ແລະ ຮັກສາບໍ່ໃຫ້ສະພາບຮ້າຍແຮງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ- ຫຼາຍຂາ ກັບເດັກນ້ອຍ ທີ່ອາຍຸເກີນ 6 ຫຼື 7 ປີ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້.
- > ສ່ວນໃຫຍ່ອາການຫົວເຂົ້າໂກ່ງເຂົ້າກັນຜິດປົກກະຕິ (knock knees) ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການຮັກສາ, ແຕ່ອາດຈະພິຈາລະນາໃຫ້ມີການມີຜ່າຕັດ ສໍາລັບກໍລະນີ ທີ່ຍັງຄົງມີອາການຮຸນແຮງ ຈົນກາຍໄວເດັກນ້ອຍໄປແລ້ວ.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ
IMPAIRMENTS

ຄົນຂາໂກ່ງ
PERSON WITH VARUS KNEES



ການຜິດຮູບຂອງຂໍ້ເຂົ້າ - ແບບຂາໂກ່ງ

VARUS KNEES

ສາເຫດ

ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ: ຂາໂກ່ງ (Bow-legs), ການໂກ່ງເຂົ້າຂອງ ຂໍ້ເຂົ້າ (Varus knees) ໄດ້ຖືກພັດທະນາກ່ອນໜ້າທີ່ເດັກນ້ອຍຈະມີອາຍຸ ຄົບ 3 ປີ ເຊິ່ງສາມາດເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດເຊັ່ນ:

- > ການພັດທະນາກະດູກທີ່ຜິດປົກກະຕິ
- > ຮອຍແຕກທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງ
- > ສານຕະກົວ ແລະ ສານພູໂອຮາຍ ທີ່ເປັນພິດ
- > ພະຍາດກະດູດອ່ອນ, ເຊິ່ງເກີດຈາກການຂາດ ວິຕາມິນ D

ອາການ


- > ຫົວເຂົ້າບໍ່ຈຸ ຫຼື ບໍ່ຈອດກັນ ໃນເວລາຍືນດ້ວຍສອງຕີນ (ຂໍ້ຂາບໍ່ຈຸກັນ)
- > ການໂກ່ງຂອງຂາ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນທັງສອງຂ້າງ (ເທົ່າກັນ)
- > ຂາໂກ່ງ ສືບຕໍ່ເກີນອາຍຸ 3 ປີ

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ສາມາດລອງ ນຳໃຊ້ ເກີບທີ່ຜະລິດພິເສດ, ເຄື່ອງຄ້ຳຊູ, ອຸປະກອນເສີມ ຫຼື ເຜືອກ ສຳລັບອາການຂາໂກ່ງ ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີອາການຮຸນແຮງ ຫຼື ເດັກນ້ອຍຍັງມີພະຍາດອື່ນໆນຳ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຊັດ ເຈນວ່າ ຈະໄດ້ຜົນດີແທ້.
- > ສາມາດຜ່າຕັດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກະດູກທີ່ໂກ່ງ ຢ່າງຮຸນແຮງຂອງເດັກນ້ອຍ.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ
IMPAIRMENTS

ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດລົມບ້າໝູ
PERSON WITH EPILEPSY



ພະຍາດລົມບ້າໝູ

EPILEPSY

ສາເຫດ

ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງສາເຫດຂອງພະຍາດລົມບ້າໝູ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ສາເຫດສາມາດ ເປັນຍ້ອນ:

- > ກຳມະພັນ
- > ການຕິດເຊື້ອໃນສະໝອງ
- > ການບາດເຈັບຢູ່ຫົວ
- > ການອຸດຕັນຂອງເສັ້ນເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງ

ອາການ

ພະຍາດລົມບ້າໝູມີລັກສະນະຊໍາເຮື້ອ, ແລະ ຍັງສາມາດເອີ້ນວ່າເປັນອາການຊັກ ຫຼື ອາການຊັກກະຕຸກ. ອາການຊັກ - ກະຕຸກ ແມ່ນ ໄລຍະເວລາທີ່ເກີດອາການໝົດສະຕິ ຫຼື ການປ່ຽນແປງທາງສະພາບຈິດໃຈ ຢ່າງກະທັນຫັນ, ປົກກະຕິມັກມາພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວແບບກະຕຸກ.

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ປ້ອງກັນອາການຊັກ, ການໃຊ້ຢາ ປ້ອງກັນອາການຊັກ-ກະຕຸກແມ່ນສາມາດຊ່ວຍໄດ້.
- > ລະຫວ່າງມີອາການຊັກ:
 - ຢ່າ ເອົາຫຍັງຍັດໃສ່ປາກຂອງຄົນເຈັບ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງມີອາການຊັກ-ກະຕຸກຢູ່
 - ຢ່າ ພະຍາຍາມໄປຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄົນເຈັບ
 - ຍ້າຍສິ່ງກົດຂວາງອອກໃຫ້ຫ່າງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກບາດເຈັບ

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ
IMPAIRMENTS

ຜູ້ທີ່ເປັນອໍທິສຊິມ
PERSON WITH AUTISM



ອໍທິສຊິມ (AUTISM)

ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງສະໜອງ

ສາເຫດ

- > ບໍ່ຮູ້ສາເຫດທັງໝົດ ຂອງ ອໍທິດຕິຊິມ (Autism)
- > ຍິນ ຫຼື ກຳມະກຳ ແມ່ນໜຶ່ງໃນປັດໃຈສ່ຽງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນ ຜູ້ໜຶ່ງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະພັດທະນາເປັນ ອໍທິດຕິກໄດ້
- > ເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດຈາກພໍ່ແມ່ທີ່ມີອາຍຸສູງ ຍິ່ງມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ
- > ເດັກນ້ອຍບາງຄົນທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະການໄດ້ຍິນ ຫຼື ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານພັດທະນາ ການອາດຈະພັດທະນາພຶດຕິກຳອໍທິດຕິຊິມໄດ້, ຖ້າຫາກ
- > ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນ ແລະ/ຫຼື ຖືກທາລຸນຢ່າງຮຸນແຮງ

ອາການ

- > ອໍທິດຕິຊິມ ສາມາດສ້າງອຸປະສັກ ໃນການເຂົ້າສັງຄົມ, ການຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈ ແລະ ພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການສື່ສານ (ສັງຄົມ ແລະ ອາລົມ)
- > ມັກບໍ່ສະແດງສັນຍານບົ່ງບອກທາງກາຍະພາບ ຫຼື ບໍ່ມີ

- > ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຮູບຮ່າງລັກສະນະພາຍນອກ.
- > ພວກເຂົາເຈົ້າອາດມີການສື່ສານ, ການໂຕ້ຕອບ, ພຶດຕິ ກຳ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ໃນຮູບແບບທີ່ຕ່າງຈາກຄົນອື່ນໆທົ່ວໄປ, ຕົວຢ່າງ: ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິສຳພັນ - ເຊື່ອມ ໂຍງກັບຄົນອື່ນ / ການເຮັດຊຳໄປຊຳມາ.

ການສະໜັບສະໜູນ

ການບຳບັດຕັ້ງແຕ່ຕອນຕົ້ນສາມາດຊ່ວຍ ປັບປຸງພັດທະນາການ ໃນການຮຽນຮູ້ ບັນດາທັກສະທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃຫ້ ແກ່ເດັກນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ການບຳບັດ ເພື່ອຊ່ວຍເດັກນ້ອຍໃນ ການເວົ້າ, ການຢ່າງ ແລະ ການໂຕ້ຕອບກັບຄົນອື່ນໆ.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ
IMPAIRMENTS

ຄົນຕີນໄງ້ງ
PERSON WITH CLUBFEET



ຕີນໂງ່ງ CLUBFOOT

ສາເຫດ

ສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເດັກນ້ອຍເກີດມາມີ ຕີນໂງ່ງ ແມ່ນບໍ່ຮູ້ ສາເຫດ.

ອາການ

- > ຕີນ (ໂດຍສະເພາະສິ້ນຕີນ) ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ
- > ຕີນອາດມີລັກສະນະຊື່ລິງ
- > ທາງດ້ານໜ້າຂອງຕີນອາດ ບິດຈຸ່ງ ໄປຫາອິກຕີນເບື້ອງໜຶ່ງ

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ການປັບ ອາການຕີນໂງ່ງ ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຄວນເລີ່ມປະມານ 2 ມື້ ຫຼັງຈາກທີ່ເດັກນ້ອຍເກີດ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ຈົນກວ່າ ເດັກນ້ອຍຈະອາຍຸຮອດ 4 ປີ.
- > 3 ໃນ 5 ຂອງ ອາການຕີນໂງ່ງ ສາມາດປັບໃຫ້ຊື່ກົງໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຜ່າຕັດ ໃນໄລະຍະເວລາ 6-8 ອາທິດ. ຖ້າຫາກທ່ານສາມາດຢຽດຕີນໃຫ້ຊື່ໃນຕໍາແໜ່ງ ທີ່ເໝາະສົມ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ກໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ກະດູກນັ້ນບໍ່ມີ ຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ແລະ ຕີນຈະປັບສະພາບໄດ້ດ້ວຍຕົວ ຂອງມັນເອງພຽງແຕ່ອອກກຳລັງກາຍເທົ່ານັ້ນ.
- > ການປັບຕໍາແໜ່ງຂອງຕີນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ໂດຍການນຳໃຊ້ ວິທີການ ແບບພິນຊີທີ (Ponseti Method), ເຊິ່ງເປັນເຕັກນິກທີ່ນຳ ໃຊ້ໃນການປັບຕໍາແໜ່ງຂອງຕີນໃຫ້ຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ ຕ້ອງຜ່າຕັດ. ບາງຄັ້ງກໍ່ອາດມີການຜ່າຕັດເພີ່ມເຕີມຫາກຈຳເປັນ ເພື່ອຊ່ວຍປັບຕໍາແໜ່ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ

IMPAIRMENTS

ຜູ້ທີ່ເປັນ

ພະຍາດໂຕດ່ອນ-ຜິວເຜືອກ

PERSON WITH ALBINISM



ພະຍາດໂຕດ່ອນ-ຜິວເຜືອກ

ALBINISM

ສາເຫດ

- > ພະຍາດໂຕດ່ອນ-ຜິວເຜືອກ ແມ່ນເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກຳມະພັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດຜະລິດ ຫຼື ກະຈາຍເມັດສີເມລານິນ ເຊິ່ງເປັນສານທຳມະຊາດທີ່ສ້າງສີ ໃຫ້ແກ່ຜິມ, ຜິວໜັງ ແລະ ມ່ານຕາ.
- > ພະຍາດໂຕດ່ອນ-ຜິວເຜືອກ ແມ່ນການສືບທອດທາງກຳມະພັນ, ດັ່ງນັ້ນ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນຈຶ່ງບໍ່ມີກຳລະນິໄດທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້.

ອາການ

- > ການສູນເສຍຂອງ ສີ ເສັ້ນຜິມ, ຜິວໜັງ ຫຼື ມ່ານຕາ; ການມີສີຜິວ ແລະ ສີຜິມອ່ອນກວ່າສີປົກກະຕິ ຫຼື ມີສີເປັນ ຈຸດໆ, ຫຼື ການສູນເສຍສີຜິວ
- > ບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ດ້ວຍການໃສ່ແວ່ນຕາ ເຊັ່ນ: ການແພ້ແສງ

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ກະໂຕຂອງ ພະຍາດໂຕດ່ອນ-ຜິວເຜືອກ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງການການປິ່ນປົວ, ແຕ່ບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ຜິວ ແລະ ຕາແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.
- > ການປົກປ້ອງ ຜິວໜັງ ແລະ ຕາຈາກແສງຕາເວັນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ການໃສ່ແວ່ນຕາກັນແດດ ໃນເວລາທີ່ຢູ່ກາງແຈ້ງ ແລະ ຫູດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກແດດເຜົາໄໝ້ ໂດຍການຫຼີກລ້ຽງແສງແດດ ໂດຍການໃຊ້ ຄຣີມກັນແດດ, ແລະ ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງປົກປິດໜົດໂຕ ເມື່ອເວລາຖືກແສງແດດ.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ
IMPAIRMENTS

ຜູ້ທີ່ມີ
ບັນຫາທາງຈິດ
PERSON WITH MENTAL HEALTH PROBLEMS



ສຸຂະພາບຈິດ

MENTAL HEALTH

ສາເຫດ

ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ (ທາງຈິດໃຈ) ແມ່ນ ອຸປະສັກອັນສໍາຄັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມສໍາລັບຫຼາຍໆຄົນ. ບັນຫາທາງຈິດສາມາດເປັນຍ້ອນ:

- > ກ່ຽວຂ້ອງກັບພັນທຸກໍາ
- > ຜົນໄດ້ຮັບຈາກປະສົບການທີ່ເຈັບປວດເຊັ່ນ: ການທາລຸນທາງເພດ, ການທາລຸນທາງຮ່າງກາຍ, ຄວາມຮຸນແຮງ, ການສູນເສຍສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມໃກ້ຊິດ ຫຼື ສິງຄາມ.
- > ສະໜອງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ-ບາດເຈັບ
- > ການເຮັດວຽກທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງຈຸລັງປະສາດໃນສະໜອງ
- > ການໃຊ້ເຄື່ອງຕື່ມມືນເມົາ ແລະ ຢາ ເປັນເວລາຍາວນານ ແລະ ຮຸນແຮງ
- > ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດແມ່ນ ບໍ່ມີສາເຫດມາຈາກ ແມ່ມິດ-ໝໍຜີ, ແລະ ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ດ້ວຍເຫດຜົນທາງວິທະຍາສາດ.

ອາການ

ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ອາລົມ, ຄວາມຄິດ ແລະ ການປະພຶດຂອງຄົນ. ມັນແຕກຕ່າງກັນໄປ ຕາມແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິ.

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ບັນຫາທາງຈິດມັກໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂດຍການປະສົມປະສານລະຫວ່າງການປິ່ນປົວທາງການແພດ ແລະ ທາງສັງຄົມ/ພຶດຕິກຳ.
- > ສິ່ງຕໍ່ໄປໃຫ້ ໜ່ວຍງານທີ່ໃຫ້ບໍລິການການປິ່ນປົວດ້ານສຸຂະພາບຈິດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຫຼື ຖ້າໃນກໍລະນີບໍ່ມີ ກໍສາມາດສົ່ງຕໍ່ໄປຫາແພດທົ່ວໄປ.
- > ຢ່າລະເລີຍ ຫຼື ປ່ອຍໃຫ້ຄົນທີ່ບັນຫາທາງຈິດຢູ່ຄົນດຽວ, ແຕ່ຈົ່ງໃຫ້ຄວາມຮັກ, ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມແກ່ພວກເຂົາ.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ

IMPAIRMENTS

ຜູ້ທີ່ກະດູກສັນຫຼັງຖືກກະທົບ

PERSON WITH A SPINAL CORD INJURY



ກະດູກສັນຫຼັງຖືກກະທົບ

SPINAL CORD INJURY

ສາເຫດ

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ ກະດູກສັນຫຼັງຖືກກະທົບມັກເກີດມາຈາກ: ການປະສົບອຸປະຕິເຫດທາງຖະໜົນ, ການລົ້ມ, ການບາດເຈັບ ຍ້ອນການຫຼິ້ນກິລາ ຫຼື ພະຍາດ.

ອາການ

ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການບາດເຈັບຂອງກະດູກສັນຫຼັງ ສາມາດ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດມີການສູນເສຍ ຫຼື ເກີດ ຄວາມບົກຜ່ອງໃນ ການເຮັດວຽກຂອງແຂນຂາ ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດ ເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶກ.

- > ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ກະດູກສັນຫຼັງ ຢູ່ ຫຼັງ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງແຂນ-ຂາ ແລະ ອາດ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ບາງສ່ວນຂອງ ກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນທ້ອງ.
- > ຄວາມເສຍຫາຍຂອງ ໄຂສັນຫຼັງຢູ່ຄໍ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງແຂນຂາທັງສີ່ສ່ວນ, ເຊັ່ນດຽວກັບກ້າມຊີ້ນໃນບໍລິເວນທ້ອງ ແລະ ໜ້າເອິກ. ນີ້ເອີ້ນວ່າ: ອຳມະພາດສ່ວນລຸ່ມ

- > ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບກັບ: ການຫາຍໃຈ, ພິກຍ່ຽວ, ລຳໄສ້, ການເຮັດວຽກທາງເພດ, ການຂັບເທື່ອ ແລະ ການ ຄວບຄຸມ ອຸນຫະພູມ

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ແຕ່ລະກໍລະນີ ຂອງ ການບາດເຈັບຂອງກະດູກສັນຫຼັງ ແມ່ນມີເອກະລັກສະເພາະຂອງໃຜມັນ - ຄວນສົ່ງຄົນເຈັບຕໍ່ ໃຫ້ສະຖາບັນສະເພາະທາງ ເພື່ອຊ່ວຍຈັດການກັບຄວາມ ຕ້ອງການຂອງຄົນເຈັບທາງດ້ານການແພດ, ລະບົບການ ເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ ສັງຄົມ.
- > ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານສັງຄົມ ແກ່ຄົນເຈັບ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຍອມຮັບກັບ ການບາດເຈັບ ແລະ ປັບໂຕ ໃຫ້ເຂົ້າກັບວິຖີຊີວິດອັນໃໝ່.

ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ
IMPAIRMENTS

ຜູ້ທີ່ເປັນ
ພະຍາດກ້າມຊີ້ນ
ອ່ອນເພຍ

PERSON WITH MUSCULAR DYSTROPHY



ພະຍາດກ້າມຊີ້ນອ່ອນເພຍ

MUSCULAR DYSTROPHY

ສາເຫດ

ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ ພະຍາດກ້າມຊີ້ນອ່ອນເພຍ (MD) ແມ່ນສືບທອດພາຍໃນ ຄອບຄົວ. ໂດຍປົກກະຕິມັກຈະຖືກພັດທະນາ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການສືບທອດ ຍືນທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຈາກພໍ່ ຫຼື ແມ່ ຫຼື ຈາກທັງພໍ່-ແມ່.

ອາການ

- > ພະຍາດກ້າມຊີ້ນອ່ອນເພຍ (MD) ແມ່ນອາການຂອງກ້າມຊີ້ນທັງໝົດ ຄ່ອຍໆສູນເສຍຄວາມແຂງແຮງ
- > ສ່ວນຫຼາຍມັກສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ, ເຊິ່ງອາການໃນ ຕອນທໍາອິດເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີອາຍຸ 3 ຫາ 5 ປີ



- > ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 10 ປີ, ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນພະຍາດກ້າມຊີ້ນອ່ອນເພຍ (MD) ຈະບໍ່ສາມາດຢ່າງໄດ້. ສິ່ງທີ່ເປັນສັນຍານບົ່ງບອກອັນທໍາອິດຂອງພະຍາດນີ້ໃນໂຕຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ນ ສັງເກດຈາກ "Gowers sign" (ສັນຍານທາງການແພດທີ່ ບົ່ງບອກຄວາມອ່ອນແອຂອງ ກ້າມຊີ້ນ ສ່ວນປາຍຂອງແຂນ-ຂາສ່ວນລຸ່ມ), ສັງເກດ ຈາກວິທີການ ໃນການຍືນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ມື ຫຼື ສິ່ງຂອງ ເພື່ອຊ່ວຍຄ້າ.

ການສະໜັບສະໜູນ

- > ພະຍາດກ້າມຊີ້ນອ່ອນເພຍ (MD) ບໍ່ຕອບ ສະໜອງຕໍ່ການຮັກສາທາງ ການແພດ ແລະ ຄົນຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ມັກອາຍຸສັ້ນ.
- > ການສະແດງຄວາມສັດຊື່ - ເວົ້າຢ່າງກົງໄປກົງມາກ່ຽວກັບ ພະຍາດນີ້ ໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຟັງ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ. ພໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີພະຍາດກ້າມຊີ້ນອ່ອນເພຍ (MD) ນັ້ນຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການຮັບມືກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ.
- > ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບ ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມ ກະຕືລືລົ້ນ, ມີກໍາລັງໃຈ ແລະ ມີຄວາມສຸກເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.
- > ເມື່ອກ້າມຊີ້ນໃນການຊົງໂຕອ່ອນເພຍລົງ, ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ວ່າ: ຄົນເຈັບຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ດີໃນ ເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້ານັ່ງ/ນອນ.


ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງກາຍ

IMPAIRMENTS

ຜູ້ທີ່ເປັນ

ພະຍາດຕົ້ນຊ້າງ

PERSON WITH LYMPHATIC FILARIASIS / ELEPHANTIASIS



ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຕີນຊ້າງ

LYMPHATIC FILARIASIS / ELEPHANTIASIS

ສາເຫດ

ພະຍາດ ແລມພາຕິກ ຟິລາຣິວສິດ (Lymphatic filariasis) ຫຼື ທີ່ຮູ້ກັນວ່າ: ພະຍາດຕີນຊ້າງ, ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການຕິດເຊື້ອ ຈາກແມ່ ທ້ອງໂຕກົມ ຫຼື ແມ່ພະຍາດພິລາເລຍ, ເຊິ່ງສາມາດແຜ່ເຊື້ອເຂົ້າສູ່ຄົນ ເຮົາຜ່ານ ໂຕຍຸງ. ຫຼັງຈາກທີ່ຄົນເຮົາ ຖືກຍຸງທີ່ຕິດເຊື້ອກັດແລ້ວ, ແມ່ ທ້ອງຊະນິດນີ້ກໍ່ຈະເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ເຂົ້າສູ່ນໍ້າເຫຼືອງ ແລະ ຫຼອດເລືອດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແບບເຊື່ອງຊ້ອນໃນລະ ບົບ ນໍ້າເຫຼືອງ. ເມື່ອແມ່ທ້ອງ ເຂົ້າໄປອຸດຕັນລະບົບນໍ້າເຫຼືອງ ແລະ ຫຼອດຜ່ອນການໄຫຼຂອງ ນໍ້າເຫຼືອງ, ຮ່າງກາຍບາງສ່ວນຈະໄຂ່ບວມຂຶ້ນ ແລະ ນີ້ຈຶ່ງເປັນທີ່ມາຂອງການເອີ້ນວ່າ: ແມ່ພະຍາດຕີນຊ້າງ (Lymphedema). ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການຕິດເຊື້ອມັກເກີດຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງໄວເດັກ, ແຕ່ພະຍາດຕີນຊ້າງ (ການໄຄ່ບວມ) ຈະພັດ ທະນາ ແລະ ສະແດງອາການອອກໃນຊ່ວງຊີວິດທີ່ເຫຼືອຂອງຄົນເຮົາ.

ອາການ

- > ພະຍາດຕີນຊ້າງ (Lymphedema): ການສະສົມທາດແຫຼວ ແລະ ອາການໄຄ່ບວມຂອງເນື້ອເຫຍື້ອໃນຂາ, ແຂນ, ເອິກ ຫຼື ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ (ຂອງແຫຼວໃນຖົງອັນທະຂອງເພດ ຊາຍມີຫຼາຍເກີນໄປ)
- > ອາການເຈັບປວດ ແລະ ການເສຍໂສມ ຈາກພະຍາດນີ້ສາ ມາດ ນໍ້າໄປສູ່ ຄວາມພິການຖາວອນ ແລະ ການຖືກຈໍາແນກ ຈາກສັງຄົມ

ການສະໜັບສະໜູນ

ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແມ່ພະຍາດສາມາດ ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍວິທີການ ທີ່ງ່າຍດາຍເຊິ່ງລວມມີ: ການມີສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ, ການຮັກ ສາຜິວໜັງ, ການອອກ ກໍາລັງກາຍ ແລະ ການຍົກ-ຫ້ອຍ ແຂນຂາທີ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອ. ສີ່ຈໍາເປັນ ຕະຫຼອດຊີວິດ ຂອງຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນພະຍາດຕີນຊ້າງແມ່ນການເຂົ້າ ເຖິງການປິ່ນປົວ.

ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ

NEGATIVE ATTITUDES

ການຖືກຂົ່ມເຫງ

BULLYING



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ

NEGATIVE ATTITUDES

**ການຖືກປ່ອຍ
ໃຫ້ໂຕດ່ຽວ**

ISOLATION



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ

NEGATIVE ATTITUDES

ໝໍຜີ / ໝໍໄສຍະສາດ

WITCH DOCTOR



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ

NEGATIVE ATTITUDES

ການຖືກແບ່ງແຍກໃນຄອບຄົວ

EXCLUSION IN THE FAMILY



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ

NEGATIVE ATTITUDES

ການປ່ອຍໃຫ້ເດັກຢູ່ແຕ່ໃນບ້ານ

CHILD KEPT AT HOME



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ

NEGATIVE ATTITUDES

ທັດສະນະຄະຕິ
ແບບຕັດສິນ
ເໝົາລວມ-ຕາຍໂຕ

STEREOTYPING




ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ

NEGATIVE ATTITUDES

ການປົກປ້ອງຈົນເກີນໄປ

OVERPROTECTIVE



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ

NEGATIVE ATTITUDES

ການຖືກປະຕິເສດ

REJECTION



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ

NEGATIVE ATTITUDES

**ການປົກປ້ອງ-
ນຳທາງພໍ່ແມ່
ທີ່ມີຄວາມພິການໄປມາ**

ESCORTING PARENT WITH IMPAIRMENT



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ

NEGATIVE ATTITUDES

ຕໍານານທາງວັດທະນະທຳ

CULTURAL MYTHS



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ

NEGATIVE ATTITUDES

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ - ແພງ

EXPENSIVE



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ

NEGATIVE ATTITUDES

ຄວາມເຊື່ອ
ທາງວັດທະນະທຳ

CULTURAL BELIEFS...



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ

NEGATIVE ATTITUDES

...ຂອງພໍ່
...OF FATHERS



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ

NEGATIVE ATTITUDES

...ຂອງແມ່

...OF MOTHERS




ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ

NEGATIVE ATTITUDES

...ຂອງເດັກນ້ອຍ

...OF CHILDREN



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ

NEGATIVE ATTITUDES

ພໍ່ແມ່ທີ່ໂສກເສົ້າ

SAD PARENTS




ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ

NEGATIVE ATTITUDES

ຕໍານານທາງວັດທະນະທໍາ

CULTURAL MYTHS



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ການຫຼິ້ນດົນຕີ

MAKING MUSIC



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ການຟ້ອນລຳ

DANCING



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສຸກ

HAPPY CHILDREN



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ການຫຼິ້ນຮ່ວມກັນ

INCLUSIVE PLAY



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ໂຮງຮຽນຮ່ວມ

INCLUSIVE SCHOOL



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ຫ້ອງຮຽນແບບຮຽນຮ່ວມ

INCLUSIVE CLASSROOM



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສຸກ

HAPPY FAMILY



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ການສະໜັບສະໜູນຈາກເພື່ອນມິດ

PEER SUPPORT




ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ໂຮງໝໍທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້

ACCESSIBLE HOSPITAL



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ກອງປະຊຸມຂອງຊຸມຊົນ

COMMUNITY WORKSHOP




ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ບ່ອນເຮັດວຽກ
ທີ່ມີຜູ້ພິການເຮັດວຽກຮ່ວມນຳ

INCLUSIVE WORKPLACE



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ການດູແລສຸຂະພາບ
ທີ່ລວມເອົາຜູ້ພິການເຂົ້ານຳ

INCLUSIVE HEALTH CARE



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ການແຕ່ງດອງ

MARRIAGE




ທັດສະນະລະຕິທໍດີ

POSITIVE ATTITUDES

ໂບດ (ອິດສະລາມ)
ທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້

ACCESSIBLE MOSQUE



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ໂບດທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້

ACCESSIBLE CHURCH



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ພໍ່ແມ່ທີ່ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ

PARENT SUPPORT



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ກຸ່ມການເງິນຈຸລະພາກ
ທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ

INCLUSIVE MICRO FINANCE GROUPS



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ

COLLECTIVE WORK



ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

POSITIVE ATTITUDES

ວັດທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້

ACCESSIBLE TEMPLE



ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ຊ່າງປັ້ນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ

POTTERY



ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ການແຕ່ງກິນກັບແມ່

COOKING WITH MUM



ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ການແຕ່ງກິນ

COOKING



ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ການປັດກວາດເຮືອນຊານ

SWEEPING



ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ການຊ້າເຄື່ອງ

WASHING CLOTHES



ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ການເຮັດນາ-ເຮັດສວນ

FARMING



~~ທັກສະ ກໍາລັບ~~

SKILLS & JOBS

ເມື່ອຂາດໂອກາດທີ່ດີ, ຄົນພິການສ່ວນຫຼາຍຈະຈົບລົງດ້ວຍການຂໍທານຕາມທ້ອງຖະໜົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ, ການຂໍທານຈະເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ອີກທາງໜຶ່ງກໍຕາມ, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນທັກສະ! ແຕ່ຖ້າວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ກ່າວເຖິງການຂໍທານວ່າເປັນທັກສະໜຶ່ງ, ໃຫ້ເອົາຮູບອອກມາສະແດງໃຫ້ເບິ່ງ ແລະ ອະທິບາຍວ່າ ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ຈະບໍ່ມີໃຜສິ່ງເສີມ.

ການຂໍທານ

BEGGING



ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ການຕໍ່າທູກ

WEAVING



ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ຊ່າງຕັດຫຍິບ

TAILORING




ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ຊ່າງແປງລົດ

MECHANIC



ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ວຽກຫ້ອງການທີ່ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ

COMPUTER WORK




ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ຊ່າງໄມ້

CARPENTER



ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ຄົນຂາຍເຄື່ອງ

SALESPERSON



ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ການຈັກສານ

BASKETWORK



ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ຊ່າງແປງວິທະຍຸ

RADIO REPAIR



ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ຊ່າງຕັດຜົມ

BARBER



ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ເຮັດທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

SMALL BUSINESS



ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ຊ່າງເຮັດຂະໜົມ

BAKERY



ທັກສະ & ອາຊີບ

SKILLS & JOBS

ການປຸກຈິດສໍານຶກ
ກ່ຽວກັບສິດທິຄົນພິການ

SELF-ADVOCACY




ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອ

ASSISTIVE DEVICES

ລໍ່ເລື້ອນ

WHEELCHAIR




ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອ

ASSISTIVE DEVICES

ລໍ້ໂຍກ - ລໍ້ແບບຖີບດ້ວຍມື

TRICYCLE




ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອ

ASSISTIVE DEVICES

ໄມ້ຄໍ້າ (ແບບ ກ)

CRUTCH (MODEL A)




ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອ

ASSISTIVE DEVICES

ໄມ້ຄ້າ (ແບບ ຂ)

CRUTCH (MODEL B)




ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອ

ASSISTIVE DEVICES

ໄມ້ຄ້າເທົ້າ

WALKING STICK



ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອ

ASSISTIVE DEVICES

ແວ່ນຕາ


GLASSES



ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອ


ASSISTIVE DEVICES

ໄມ້ນໍາທາງ
ຂອງຜູ້ພິການຕາ
WHITE CANE



ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອ
ASSISTIVE DEVICES

ຂາທຽມ
LEG PROSTHESIS




ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອ

ASSISTIVE DEVICES

ເຄື່ອງຄໍ້າຊູຂາ
(ຫຼາບຂາ)

LEG BRACE



ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອ

ASSISTIVE DEVICES

ເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງ

HEARING AID



ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອ

ASSISTIVE DEVICES

ອຸປະກອນຊ່ວຍຍ່າງ

WALKER




ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອ

ASSISTIVE DEVICES

ແຂນທຽມ

ARM PROSTHESIS



ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອ

ASSISTIVE DEVICES

ການພື້ນຟູ
REHABILITATION

